

令和2年都道府県別生命表における平均寿命の地域差分析

シュトウ ヨウヘイ イイダ ユウト カミヒラ ハヤオ ヤスカワ マナブ
 首藤 陽平*1 飯田 悠斗*2 上平 駿*2 安川 学*3

目的 令和2年都道府県生命表において、各都道府県の平均寿命の全国の平均寿命に対する差（地域差）を、年齢階級別・死因別の寄与へと分解することによって、地域差の要因を明らかにする。また、平成27年と令和2年の年齢階級別・死因別の寄与を比較することによって、その経年変化を明らかにする。

方法 各都道府県の平均寿命と全国の平均寿命の差（地域差）に対する年齢階級別の寄与は、全国の死亡率を低い年齢から順次、各都道府県の死亡率に置き換えたときの平均寿命の変化量として算出した。また、死因別の寄与は各年齢に対し、死亡率を死因別に分解することで同様に死因別寄与を求め、全年齢の総和として算出した。

結果 男で平均寿命が最も長い滋賀県は、年齢階級別では主に50～84歳がプラスに寄与している。また、死因別では不慮の事故と自殺を除く死因がプラスに寄与している。女で平均寿命が最も長い岡山県は、年齢階級別では主に55～89歳がプラスに寄与している。また、死因別では悪性新生物＜腫瘍＞の寄与が最も大きい。さらに、平成27年と令和2年で地域差を比較すると、地域差は拡大している。

結論 各都道府県の平均寿命と全国の平均寿命の差（地域差）を年齢階級別、死因別に分析するとそれぞれの特徴は都道府県により異なる。また、地域差の年齢階級別・死因別寄与の経年変化を観察することで、地域差の変化や平均寿命の都道府県別順位の変化の要因を詳細に分析できる。

キーワード 都道府県別生命表、平均寿命、地域差、年齢階級、死因、寄与

I はじめに

令和4年12月23日、令和2年都道府県別生命表¹⁾が公表された。平均寿命が最も長い都道府県は、男が滋賀県で82.73年、女が岡山県で88.29年となっており、全国よりもそれぞれ1.24年、0.69年長くなっている。一方、平均寿命が最も短い都道府県は男女とも青森県で男79.27年、女86.33年となっており、全国よりもそれぞれ2.22年、1.28年短くなっている。このように、各都道府県の平均寿命は差があることがわかる。各都道府県の平均寿命と全国の平均寿命の差（平均寿命の地域差。以下、地域差）の要因については、令和2年都道府県別生命表の中でも、死因別死亡確率（生命表上のある年齢の者が将来どの死因で死亡するか算出した確率）や特定死因を除去した場合の平均余

命の延びを算出し、死因別に分析を行っているが、本稿では、各都道府県の地域差（全国値との差）について、各都道府県の年齢階級・死因における死亡率の違いがどの程度地域差に寄与したかを算出する。これによって、各都道府県において全国の平均寿命を上回った要因や下回った要因が、どの年齢階級あるいはどの死因における死亡率で説明されるのかがわかる。

さらに、令和2年の地域差の年齢階級別・死因別寄与の結果と平成27年²⁾の結果とを比較して、両者の違いを分析する。

II 方法

以下では、地域差を年齢階級別・死因別の寄与へと分解する方法を述べる。詳細については首藤

*1 厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)付参事官(企画調整担当)付審査解析室主査（現：全国健康保険協会本部企画部調査分析・研究グループ主任） *2 同室 *3 同室長補佐

ら⁴⁾の論文（本誌12～17頁）を参照されたい。

（1）年齢階級別寄与年数への分解

平均寿命は年齢階級別死亡率に基づいて算出される。したがって、各都道府県と全国の平均寿命の差はそれぞれの年齢階級別死亡率の違いに帰せられることになる。この帰属のさせ方により、平均寿命の延びを年齢階級別寄与に分解する方法はいくつか考えられるが、本稿では次の方法による。

${}_nq_x^{\text{県}}$, ${}_nq_x^{\text{全国}}$ をそれぞれ各都道府県、全国の x 歳以上 $x+n$ 歳未満の死亡率とする。また、定常人口 ${}_nL_x$ の算出には台形公式を用いるとする。すると、各年齢階級の死亡率の組

$$({}_{4w}q_0, \dots, q_1, q_2, \dots, q_{129})$$

を1つ与えると、生命表が1つ定まることとなり、その平均寿命 e_0 が計算される。したがって、平均寿命を死亡率の組の関数とみなすことができる。これをいふ、

$$e_0 = e_0({}_{4w}q_0, \dots, q_1, q_2, \dots, q_{129})$$

と書くことにする。すると、平均寿命の地域差（全国値との差）は、

$$\begin{aligned} e_0^{\text{県}} - e_0^{\text{全国}} &= e_0({}_{4w}q_0^{\text{県}}, \dots, q_1^{\text{県}}, q_2^{\text{県}}, \dots, q_{129}^{\text{県}}) \\ &\quad - e_0({}_{4w}q_0^{\text{全国}}, \dots, q_1^{\text{全国}}, q_2^{\text{全国}}, \dots, q_{129}^{\text{全国}}) \\ &= \{ e_0({}_{4w}q_0^{\text{県}}, \dots, q_{128}^{\text{県}}, q_{129}^{\text{県}}) \\ &\quad - e_0({}_{4w}q_0^{\text{全国}}, \dots, q_{128}^{\text{全国}}, q_{129}^{\text{全国}}) \} \\ &\quad + \{ e_0({}_{4w}q_0^{\text{県}}, \dots, q_{128}^{\text{県}}, q_{129}^{\text{全国}}) \\ &\quad - e_0({}_{4w}q_0^{\text{全国}}, \dots, q_{128}^{\text{全国}}, q_{129}^{\text{全国}}) \} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + \{ e_0({}_{4w}q_0^{\text{県}}, {}_{2m-4w}q_{4w}^{\text{全国}}, \dots, q_{129}^{\text{全国}}) \\ &\quad - e_0({}_{4w}q_0^{\text{全国}}, {}_{2m-4w}q_{4w}^{\text{全国}}, \dots, q_{129}^{\text{全国}}) \} \end{aligned}$$

と展開可能であるから、平均寿命の地域差に対する、年齢階級 x 歳以上 $x+n$ 歳未満の寄与年数 ${}_nI_x$ (年)を、

$$\begin{aligned} {}_nI_x &= e_0(\text{県の死亡率}, {}_nq_x^{\text{県}}, \text{全国の死亡率}) \\ &\quad - e_0(\text{県の死亡率}, {}_nq_x^{\text{全国}}, \text{全国の死亡率}) \end{aligned}$$

により定義すると、

$$(x, n)$$

$$= (0, 4w), (4w, 2m-4w), (2m, 1m), (3m, 3m), (6m, 6m), (1, 1), \dots, (129, 1)$$

として、

$$e_0^{\text{県}} - e_0^{\text{全国}} = \sum_{(x, n)} {}_nI_x$$

なる分解が可能であることがわかる。ここで、 ${}_nI_x$

は具体的な計算から、

$${}_nI_x = \frac{I_x^{\text{県}}}{l_0} \left(\frac{n}{2} + e_{x+n}^{\text{全国}} \right) ({}_nq_x^{\text{全国}} - {}_nq_x^{\text{県}})$$

と表されることがわかる。

（2）年齢階級別・死因別寄与年数への分解

年齢階級 x 歳以上 $x+n$ 歳未満における、第 i 死因による死因別寄与年数 ${}_nI_x^i$ (年)は、死亡率に死因別の死亡数割合を乗じることで死亡率を加法分解し、その分解を用いて年齢階級別寄与年数 ${}_nI_x$ を、さらに死因 i 別に分解することで求めた。

具体的には、まず、令和2年都道府県別生命表における死因分析と同様の死亡数割合を用いて、

$${}_nq_x^{(i)} = \frac{D_x^i}{{}_nD_x} {}_nq_x$$

により、死亡率を分解した（分母が0となる場合には、死亡数を取る年齢階級をさらに前後1区間延長した）。すべての死因を尽くせば、

$$\sum_i {}_nq_x^{(i)} = {}_nq_x$$

が成り立つことから、

$${}_nI_x = \frac{I_x^{\text{県}}}{l_0} \left(\frac{n}{2} + e_{x+n}^{\text{全国}} \right) ({}_nq_x^{\text{全国}(i)} - {}_nq_x^{(i)})$$

と置けば、

$${}_nI_x = \sum_i {}_nI_x^i$$

なる分解ができることがわかる。

（3）死因別寄与年数の算出

（1）および（2）の結果から、平均寿命の地域差は、

$$e_0^{\text{県}} - e_0^{\text{全国}} = \sum_{(x, n) \times i} {}_nI_x^i$$

と、 $(x, n) \times i$ マトリックスに展開可能であることがわかるので、死因別寄与年数 I^i (年)を、

$$I^i = \sum_{(x, n)} {}_nI_x^i$$

により求めた。

（4）使用したデータ

令和2年都道府県別生命表および令和元～3年の人口動態統計を用いた。

(5) 留意点

年齢階級別・死因別寄与分解の定義から明らかであるが、各都道府県の年齢階級別の寄与の合計は当該都道府県の地域差に一致する。また、死因別の寄与についても同様である。ただし、端数処理の関係で一致しない場合もある。

なお、平成27年の年齢階級別・死因別寄与については首藤³⁾の結果を用いている。

Ⅲ 結果・考察

(1) 令和2年の男の都道府県別の地域差

図1-1は、令和2年の男の平均寿命が長い都道府県から順に並べ、各都道府県の地域差を0～64歳、65～74歳、75歳以上の年齢階級別の寄与に分解したものである^{注1)}。

平均寿命が最も長い滋賀県(男)の地域差は+1.24年であり、その年齢階級別寄与は0～64歳が+0.52年、65～74歳が+0.37年、75歳以上が+0.35年となっており、すべての年齢階級でプラスの寄与となっている。

一方、平均寿命が最も短い青森県(男)の地域差は-2.22年であり、その年齢階級別寄与は0～64歳が-1.03年、65～74歳が-0.54年、75歳以上が-0.65年となっており、すべての年齢階級でマイナスの寄与となっている。

また、全国よりも平均寿命が長い都道府県はおおむねすべての年齢階級でもプラスの寄与となっている一方、全国よりも平均寿命が短い都道府県は、おおむねすべての年齢階級でもマイナスの寄与となっているなど特徴的な都道府県もある^{注2)}。

図1-2は、令和2年の男の平均寿命が長い都道府県から順に並べ、

図1-1 平均寿命の地域差の年齢階級別寄与(男)(平均寿命の長い順)





図1-2 平均寿命の地域差の死因別寄与(男)(平均寿命の長い順)



各都道府県の地域差を主な死因別の寄与に分解したものである。

平均寿命が最も長い滋賀県(男)では、死因別寄与は悪性新生物＜腫瘍＞が+0.27年など、自殺以外のすべての主な死因でプラスの寄与となっている。平均寿命が最も短い青森県(男)では、新型コロナウイルス感染症以外のすべての主な死因でマイナスの寄与であり、特に、3大死因（悪性新生物＜腫瘍＞、心疾患（高血圧性を除く。以下同じ）、脳血管疾患）の寄与が大きくマイナスに

なっている。

なお各死因の寄与と地域差の相関をみると、男については悪性新生物＜腫瘍＞の寄与と地域差は正の相関が強いことがわかる^{注3)}が、その他の特徴は都道府県により異なっている。

（2）令和2年の女の都道府県別の地域差

図2-1は、令和2年の女の平均寿命が長い都道府県から順に並べ、各都道府県の地域差を0～64歳、65～74歳、75歳以上の年齢階級別の寄与に分解したものである。

女の都道府県別の地域差は最高+0.69年から最低-1.28年と男と比べて、地域差の幅が小さくなっている。

女も男と同様、全国よりも平均寿命が長い都道府県はおおむねすべての年齢階級でもプラスの寄与であり、反対に全国よりも平均寿命が短い都道府県はおおむねすべての年齢階級でもマイナスの寄与となっているが、全国より平均年齢が長い沖縄県(女)で0～74歳の寄与がマイナスとなっている。また、全国より平均年齢が短い山形県(女)で65～74歳の寄与がプラスになっているなど特徴的な都道府県もある^{注4)}。

図2-2は、令和2年の女の平均寿命が長い都道府県から順に並べ、各都道府県の地域差を主な死因別の寄与に分解したものである。

平均寿命が最も長い岡山県(女)では、すべての死因でプラスの寄与となっており、平均寿命が最も短い青森県(女)では、

図2-1 平均寿命の地域差の年齢階級別寄与(女)(平均寿命の長い順)





図2-2 平均寿命の地域差の死因別寄与(女)(平均寿命の長い順)



新型コロナウイルス感染症、自殺を除くすべての主な死因でマイナスの寄与となっている。

なお各死因の寄与と地域差の相関をみると、女についても悪性新生物＜腫瘍＞の寄与と地域差は正の相関が強いことがわかる^{注5)}が、その他の特徴は都道府県により異なる。

(3) 都道府県別にみた地域差の年齢階級別、死因別寄与(令和2年、平成27年)

ここでは、以下の3つの視点における地域差の

表1-1 都道府県別平均寿命・順位・地域差
(令和2年、平成27年) 男

	平均寿命(年)			順位			地域差(年)		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
全 国	81.49	80.77	0.72	...	...	...	...	...	...
滋賀県	82.73	81.78	0.95	1	1	—	1.24	1.00	0.23
長野県	82.68	81.75	0.93	2	2	—	1.19	0.98	0.21
奈良県	82.40	81.36	1.04	3	4	+1	0.91	0.58	0.32
京都府	82.24	81.40	0.84	4	3	-1	0.75	0.63	0.12
神奈川県	82.04	81.32	0.72	5	5	—	0.54	0.54	0.00
石川県	82.00	81.04	0.96	6	12	+6	0.51	0.27	0.24
福岡県	81.98	81.27	0.71	7	6	-1	0.49	0.50	-0.01
広島県	81.95	81.08	0.86	8	9	+1	0.45	0.31	0.14
熊本県	81.91	81.22	0.69	9	7	-2	0.41	0.44	-0.03
熊岡県	81.90	81.03	0.87	10	13	+3	0.41	0.26	0.15
岐阜県	81.90	81.00	0.90	11	14	+3	0.41	0.23	0.18
分知県	81.88	81.08	0.81	12	10	-2	0.39	0.30	0.09
愛知県	81.77	81.10	0.67	13	8	-5	0.28	0.33	-0.05
東京都	81.77	81.07	0.70	14	11	-3	0.27	0.29	-0.02
富山県	81.74	80.61	1.13	15	27	+12	0.25	-0.16	0.41
兵庫県	81.72	80.92	0.80	16	18	+2	0.23	0.15	0.08
山梨県	81.71	80.85	0.86	17	21	+4	0.22	0.07	0.15
山宮県	81.70	80.99	0.71	18	15	-3	0.20	0.22	-0.01
三重県	81.68	80.86	0.82	19	19	—	0.18	0.08	0.10
島根県	81.63	80.79	0.84	20	23	+3	0.14	0.01	0.13
静岡県	81.59	80.95	0.63	21	17	-4	0.09	0.18	-0.09
香川県	81.56	80.85	0.71	22	20	-2	0.07	0.08	-0.01
千代田県	81.45	80.96	0.48	23	16	-7	-0.05	0.19	-0.24
埼玉県	81.44	80.82	0.62	24	22	-2	-0.06	0.04	-0.10
佐賀県	81.41	80.65	0.76	25	26	+1	-0.08	-0.12	0.04
山形県	81.39	80.52	0.87	26	29	+3	-0.11	-0.26	0.15
福岡県	81.38	80.66	0.71	27	25	-2	-0.11	-0.11	0.00
鳥取県	81.34	80.17	1.17	28	39	+11	-0.15	-0.61	0.45
新潟県	81.29	80.69	0.60	29	24	-5	-0.20	-0.09	-0.12
徳島県	81.27	80.32	0.95	30	33	+3	-0.22	-0.45	0.23
宮崎県	81.15	80.34	0.81	31	32	+1	-0.34	-0.43	0.09
愛媛県	81.13	80.16	0.97	32	40	+8	-0.36	-0.61	0.25
群馬県	81.13	80.61	0.52	33	28	-5	-0.36	-0.17	-0.20
山口県	81.12	80.51	0.61	34	30	-4	-0.37	-0.27	-0.11
和歌山県	81.03	79.94	1.09	35	44	+9	-0.46	-0.83	0.37
長崎県	81.01	80.38	0.63	36	31	-5	-0.48	-0.40	-0.09
栃木県	81.00	80.10	0.90	37	42	+5	-0.49	-0.67	0.18
鹿児島県	80.95	80.02	0.92	38	43	+5	-0.55	-0.75	0.21
北海道	80.92	80.28	0.64	39	35	-4	-0.58	-0.49	-0.08
茨城県	80.89	80.28	0.60	40	34	-6	-0.60	-0.49	-0.11
大阪府	80.81	80.23	0.57	41	38	-3	-0.69	-0.54	-0.15
高知県	80.79	80.26	0.52	42	37	-5	-0.71	-0.51	-0.20
沖縄県	80.73	80.27	0.46	43	36	-7	-0.76	-0.50	-0.26
岩手県	80.64	79.86	0.78	44	45	+1	-0.86	-0.91	0.06
福島県	80.60	80.12	0.48	45	41	-4	-0.89	-0.65	-0.24
秋田県	80.48	79.51	0.96	46	46	—	-1.02	-1.26	0.24
青森県	79.27	78.67	0.61	47	47	—	-2.22	-2.11	-0.11

年齢階級別、死因別寄与について、分析した。平均寿命の地域差は、平成27年から令和2年にかけて拡大している^{注6)}(表1-1, 1-2)。

- ・平均寿命が最も長い・最も短い都道府県(1)および2))
- ・平成27年から令和2年の平均寿命の伸びが最も大きかった都道府県と最も小さかった都道府県(3)および4))
- ・平成27年から令和2年の平均寿命の順位が最も上がった都道府県と最も下がった都道府県(5)および6))

なお、ここでは、都道府県ごとの地域差の要因をさらに詳細にみるため、年齢階級別は5歳階級に、死因別は14の死因別に寄与を表に示した。また、地域差の前回からの変化を把握するため、平成27年の結果については首藤ら³⁾の結果を用いている。

さらに、すべての都道府県について、年齢階級別、死因別の表を作成している(表2)。

1) 平均寿命が最も長い都道府県の地域差

令和2年において、平均寿命が最も長い都道府県は、男は滋賀県で82.73年、女は岡山県で88.29年となっている。

滋賀県(男)の地域差は、令和2年で+1.24年であり、その要因を年齢階級別にみると、50～84歳までの各5歳階級の寄与が65～69歳および75～79歳の+0.19年をピークに大きくなっている。また、死因別にみると不慮の事故、自殺を除くすべての死因の寄与がプラスであり、特に悪性新生物＜腫瘍＞、心疾患の寄与が大きい。

滋賀県(男)の平成27年と令和2年の地域差を比較すると、+1.00年から+1.24年に拡大しており、年齢階級別では最も寄与が大きい階級が65～69歳から65～69歳および75～79歳へとその内訳が変化し

ているが、死因別では両年とも悪性新生物＜腫瘍＞の寄与が最も大きい。

岡山県(女)の地域差は、令和2年では+0.69年であり、その要因を年齢階級別にみると、55～89歳まで、特に75～79歳の+0.12年の寄与が大きくなっている。また、死因別には、悪性新生物＜腫瘍＞、脳血管疾患、老衰の寄与が大きい。

岡山県(女)の平成27年と令和2年の地域差を比較すると、+0.66年から+0.69年に拡大しているものの、年齢階級別・死因別での寄与はほぼ同じ

傾向を示している。死因別では肺炎のマイナスの寄与が改善しつつ、両年とも悪性新生物＜腫瘍＞の寄与が最も大きい。

2) 平均寿命が最も短い都道府県の地域差

令和2年の平均寿命が最も短い都道府県は男女とも青森県であり、男は79.27年、女は86.33年となっている。

青森県(男)の地域差は、令和2年では-2.22年であり、その要因を年齢階級別にみると、15～94歳の年齢階級で寄与がマイナスになっており、特に55～84歳の寄与が大きくマイナスである。また、死因別にみると3大死因、肺炎、不慮の事故の寄与が大きくマイナスになっている一方、新型コロナウイルス感染症の寄与はプラスとなっている。

青森県(男)の平成27年と令和2年の地域差を比較すると、-2.11年から-2.22年とマイナス幅が拡大している。その要因を年齢階級別にみると、0歳で寄与がマイナスに転じ、25～39歳および55～84歳の各年齢階級で寄与のマイナス幅が拡大している。死因別には、自殺、心疾患の寄与のマイナスが大きくなっている一方で、肺炎、糖尿病の寄与のマイナスは大きく改善している。

青森県(女)の地域差は、令和2年では、-1.28年であり、その要因を年齢階級別にみると、10～19歳および100歳以上を除く各年齢階級で寄与がマイナスになっている。また、死因別には3大死因などの寄与がマイナスになっている。

青森県(女)の平成27年と令和2年の地域差を比較すると、-1.07年から-1.28年とマイナス幅が拡大している一方、全体的な傾向はあまり変わっていない。その要因を年齢階級別にみると、令和2年では50～94歳の多くの年齢階級で寄与のマイナスが大きくなっている。また、死因別には悪性新生物

表1-2 都道府県別平均寿命・順位・地域差
(令和2年、平成27年) 女

	平均寿命(年)			順位			地域差(年)		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
全 国	87.60	87.01	0.60	...	...	...	...	...	...
岡 山 県	88.29	87.673	0.62	1	2	+1	0.69	0.66	0.02
滋 賀 県	88.26	87.57	0.69	2	4	+2	0.66	0.57	0.09
京 都 府	88.25	87.35	0.89	3	9	+6	0.64	0.35	0.30
長 野 県	88.23	87.675	0.56	4	1	-3	0.63	0.67	-0.04
熊 本 県	88.22	87.49	0.73	5	6	+1	0.62	0.48	0.14
鳥 取 県	88.21	87.64	0.57	6	3	-3	0.61	0.64	-0.02
島 根 県	88.16	87.33	0.83	7	10	+3	0.56	0.32	0.23
石 川 県	88.11	87.28	0.83	8	13	+5	0.50	0.27	0.23
大 分 県	87.99	87.31	0.68	9	12	+3	0.39	0.30	0.09
富 山 県	87.97	87.42	0.55	10	8	-2	0.37	0.42	-0.05
奈 良 県	87.95	87.25	0.69	11	16	+5	0.34	0.24	0.10
山 梨 県	87.94	87.22	0.72	12	18	+6	0.34	0.21	0.13
山 東 県	87.91	87.27	0.64	13	14	+1	0.31	0.26	0.04
兵 庫 県	87.90	87.07	0.84	14	25	+11	0.30	0.06	0.24
神 奈 川 県	87.89	87.24	0.66	15	17	+2	0.29	0.23	0.06
沖 縄 県	87.88	87.44	0.44	16	7	-9	0.28	0.44	-0.16
東 京 都	87.86	87.26	0.60	17	15	-2	0.25	0.25	0.00
高 知 県	87.84	87.01	0.83	18	26	+8	0.24	0.00	0.24
福 井 県	87.84	87.54	0.30	19	5	-14	0.23	0.53	-0.29
佐 賀 県	87.78	87.12	0.66	20	23	+3	0.17	0.11	0.06
福 岡 県	87.70	87.14	0.56	21	21	-	0.10	0.13	-0.03
香 川 県	87.64	87.21	0.43	22	19	-3	0.04	0.20	-0.16
宮 崎 県	87.60	87.12	0.48	23	22	-1	-0.01	0.11	-0.12
崎 玉 県	87.59	86.99	0.60	24	27	+3	-0.01	-0.02	0.01
新 潟 県	87.57	87.32	0.25	25	11	-14	-0.03	0.31	-0.34
鹿 児 島 県	87.53	86.78	0.75	26	36	+10	-0.07	-0.23	0.16
愛 知 県	87.52	86.86	0.66	27	32	+5	-0.08	-0.15	0.07
岐 阜 県	87.51	86.82	0.69	28	34	+6	-0.09	-0.19	0.10
宮 城 県	87.51	87.16	0.35	29	20	-9	-0.10	0.15	-0.24
千 葉 県	87.50	86.91	0.59	30	30	-	-0.10	-0.10	0.00
静 岡 県	87.48	87.10	0.38	31	24	-7	-0.12	0.09	-0.21
山 口 県	87.43	86.88	0.55	32	31	-1	-0.17	-0.13	-0.05
徳 島 県	87.42	86.66	0.76	33	40	+7	-0.18	-0.35	0.17
長 崎 県	87.41	86.97	0.44	34	28	-6	-0.20	-0.04	-0.16
山 形 県	87.38	86.96	0.42	35	29	-6	-0.22	-0.05	-0.17
大 阪 府	87.37	86.73	0.64	36	38	+2	-0.24	-0.28	0.04
和 歌 山 県	87.36	86.47	0.88	37	41	+4	-0.25	-0.53	0.29
愛 媛 県	87.34	86.82	0.52	38	35	-3	-0.27	-0.19	-0.08
埼 玉 県	87.31	86.66	0.65	39	39	-	-0.29	-0.34	0.05
群 馬 県	87.18	86.84	0.34	40	33	-7	-0.42	-0.17	-0.25
秋 田 県	87.10	86.38	0.72	41	44	+3	-0.50	-0.63	0.13
北 海 道	87.08	86.77	0.31	42	37	-5	-0.52	-0.23	-0.29
岩 手 県	87.05	86.44	0.62	43	42	-1	-0.55	-0.57	0.02
茨 城 県	86.94	86.33	0.61	44	45	+1	-0.66	-0.68	0.01
栃 木 県	86.89	86.24	0.65	45	46	+1	-0.71	-0.77	0.05
福 島 県	86.81	86.40	0.41	46	43	-3	-0.79	-0.60	-0.19
青 森 県	86.33	85.93	0.39	47	47	-	-1.28	-1.07	-0.20

＜腫瘍＞の寄与が大きくマイナスになっている。

3) 平均寿命の伸びが最も大きかった都道府県の地域差

平成27年から令和2年の平均寿命の伸びが最も大きかった都道府県は、男は鳥取県、女は京都府で、それぞれ+1.17年、+0.89年の伸びとなっている。

鳥取県(男)の地域差は、令和2年では-0.15年であり、その要因を年齢階級別にみると、0～4歳、30～39歳、55～74歳などの年齢階級で寄与はマイナスである。また、死因別には心疾患の寄与が大きくプラスになっている一方、悪性新生物＜腫瘍＞の寄与が大きくマイナスになっている。

鳥取県(男)の平成27年と令和2年の地域差を比較すると、-0.61年から-0.15年と改善している。その要因を年齢階級別にみると、20～29歳、35～54歳、65～84歳の寄与が大きく改善している。また、死因別には、悪性新生物＜腫瘍＞、心疾患の寄与が大きく改善している。

京都府(女)の地域差は、令和2年では0.64年である。その要因を年齢階級別にみると、すべての年齢階級で寄与が0またはプラスとなっている。また、死因別には、悪性新生物＜腫瘍＞、不慮の事故、肺炎などの寄与がプラスとなっている。

京都府(女)の平成27年と令和2年の地域差を比較すると、地域差は0.35年から0.64年と改善している。その要因を年齢階級別にみると0歳、75～94歳などの寄与が改善している。また、死因別には悪性新生物＜腫瘍＞、肺炎などの寄与が改善している。

4) 平均寿命の伸びが最も小さかった都道府県の地域差

平成27年から令和2年の平均寿命の伸びが最も小さかったのは、男は沖縄県、女は新潟県であり、伸びはそれぞれ+0.46年、+0.25年となっている。

沖縄県(男)の地域差は、令和2年では-0.76年である。その要因を年齢階級別にみると、75～99歳などの階級で寄与がプラスとなっているが、30～74歳などの年齢階級で寄与がマイナスとなっている。また、死因別には、脳血管疾患、肝疾患などの寄与がマイナスとなっている。

沖縄県(男)の平成27年と令和2年の地域差を比較すると、地域差は-0.50年から-0.76年と、マイナス幅が拡大している。その要因を年齢階級別

にみると、40～79歳の多くの階級で寄与が悪化している。また、死因別には悪性新生物＜腫瘍＞、脳血管疾患、肝疾患などで寄与が悪化している。

新潟県(女)の地域差は、令和2年では-0.03年であり、その要因を年齢階級別にみると、85～94歳などの階級で寄与がマイナスになっている。また、死因別には、脳血管疾患、老衰などの寄与がマイナスとなっている。

新潟県(女)の平成27年と令和2年の地域差を比較すると、地域差は+0.31年から-0.03年と、プラスからマイナスへと転じている。その要因を年齢階級別にみると50～54歳、75～79歳、85～94歳などの階級で寄与が悪化している。また、死因別には悪性新生物＜腫瘍＞、肺炎などの寄与が悪化している。

5) 平均寿命の順位が最も上がった都道府県の地域差

平成27年から令和2年で、平均寿命の順位が最も上がった都道府県は、男は富山県、女は兵庫県である。富山県(男)は、27位から15位へと12位順位が上がった。兵庫県(女)は、25位から14位へと11位順位が上がっている。

6) 平均寿命の順位が最も下がった都道府県の地域差

平成27年から令和2年で、平均寿命の順位が最も下がった都道府県は、男は千葉県および沖縄県、女は福井県および新潟県である。千葉県(男)は16位から23位へと、沖縄県(男)は36位から43位へと7位順位が下がった。福井県(女)は5位から19位へと、新潟県(女)は11位から25位へと14位順位が下がっている。

(4) 新型コロナウイルス感染症による都道府県の地域差に与える影響

最後に、図1-2、図2-2、表2をもとに、令和2年都道府県別生命表で死因に追加された新型コロナウイルス感染症が都道府県の地域差に与えた影響を分析する^{注7)}。

まず、新型コロナウイルス感染症の寄与のプラス幅が最も大きかったのは、男は鳥取県、島根県など7都道府県、女は鳥取県、島根県など10都道府県である。寄与のマイナス幅が最も大きかったのは、男は大阪府、女は沖縄県であった。各都道府県の寄与は男で-0.07年～+0.05年、女で

-0.06年～+0.03年である。

新型コロナウイルス感染症の寄与と平均寿命の長さに相関はみられないが^{注8)}、地域差への寄与がマイナスとなった都道府県は、北海道、沖縄県および首都圏および近畿圏の一部^{注9)}となっている。

Ⅳ ま と め

本稿においては各都道府県の地域差を年齢階級別、死因別に寄与分解することにより、その地域差の要因を分析した。

年齢階級別にみると、地域差は特定の年齢層の寄与によるものではなく、平均年齢が長い都道府県は、各年齢層で長く、逆に平均年齢が短い都道府県は各年齢層で短い傾向にあることがわかった^{注10)}。

また死因別にみると、令和2年の地域差は悪性新生物＜腫瘍＞の寄与が大きい傾向にあるが、その他の特徴は都道府県・男女により異なることがわかった^{注11)}。また、新型コロナウイルス感染症により、主に北海道、沖縄県および首都圏および近畿圏の一部の地域差にマイナスの影響があった。

さらに、これらの都道府県の傾向は、平成27年および令和2年を通じて大きく変化しておらず、経年変化はそれほど大きくないことがわかった。

最後に、本稿で述べた所見は筆者の個人的な見解であることを申し添える。

注1)「年齢階級」とは、Ⅲ(1)(2)では0～64歳、65～74歳、75歳以上の3階級を、Ⅲ(3)では表2の年齢階級を指す。

2) 年齢階級ごとの決定係数は、0～64歳が0.84、65～74歳が0.88、75歳以上が0.31である。

3) 悪性新生物＜腫瘍＞の決定係数は0.65であり、それ

以外の死因の決定係数は0.5未満である。

4) 年齢階級ごとの決定係数は、0～64歳が0.55、65～74歳が0.77、75歳以上が0.72である。

5) 悪性新生物＜腫瘍＞の決定係数は0.54であり、それ以外の死因の決定係数は0.5未満である。

6) 平均寿命が最も長い都道府県と最も短い都道府県の差は、平成27年の男は滋賀県と青森県の3.11年、女は長野県と青森県の1.74年に対して、令和2年の男は滋賀県と青森県の3.46年、女は岡山県と青森県の1.96年となっている。

7) 令和2年都道府県別生命表は、令和元～3年の死亡状況をもとに作成している点に留意。

8) 男女ともに決定係数は0.00。

9) 具体的には埼玉県、千葉県(男)、東京都、神奈川県(男)、大阪府、兵庫県である。

10) 男では65～69歳をピークに40～84歳の各年齢階級で決定係数が0.5以上になっている。また、女では75～79歳をピークに55～89歳の各年齢階級で決定係数が0.5以上になっている。

11) 死因別の決定係数が0.5以上であるのは、平成27年の男の悪性新生物＜腫瘍＞、令和2年の男の悪性新生物＜腫瘍＞、腎不全および女の悪性新生物＜腫瘍＞である。

文 献

- 1) 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)。令和2年都道府県別生命表。2022。
- 2) 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)。平成27年都道府県別生命表。2018。
- 3) 首藤陽平、嶋村拓生、六車史。平成27年都道府県別生命表における平均寿命の地域差分析。厚生指標 2019; 66(3): 32-85。
- 4) 首藤陽平、安川学。簡易生命表における平均寿命の延びの寄与年数への分解。厚生指標 2023; 70(8): 12-17。

表2 各都道府県における平均寿命の地域差の年齢階級別・死因別寄与
北海道 青森県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	北海道	全国	地域差	北海道	全国	地域差
令和2年	80.92	81.49	-0.58	87.08	87.60	-0.52
平成27年	80.28	80.77	-0.49	86.77	87.01	-0.23

	男			女		
	青森県	全国	地域差	青森県	全国	地域差
令和2年	79.27	81.49	-2.22	86.33	87.60	-1.28
平成27年	78.67	80.77	-2.11	85.93	87.01	-1.07

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.03	0.01	-0.04	-0.01	0.00	-0.01
1～4	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01
5～9	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
10～14	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
15～19	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
20～24	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
25～29	-0.03	-0.03	0.00	-0.01	-0.02	0.01
30～34	-0.04	-0.04	0.00	-0.03	-0.01	-0.02
35～39	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	0.01
40～44	-0.04	-0.04	0.00	-0.01	-0.02	0.01
45～49	-0.04	-0.04	0.00	-0.03	-0.03	0.00
50～54	-0.04	-0.03	-0.01	-0.05	-0.04	-0.01
55～59	-0.04	-0.04	0.00	-0.06	-0.07	0.01
60～64	-0.05	-0.05	0.00	-0.08	-0.07	-0.01
65～69	-0.05	-0.05	0.00	-0.11	-0.06	-0.05
70～74	-0.05	-0.10	0.05	-0.10	-0.06	-0.04
75～79	-0.09	-0.07	-0.02	-0.08	-0.02	-0.06
80～84	-0.04	0.00	-0.04	-0.03	0.04	-0.07
85～89	0.01	0.01	0.00	0.04	0.08	-0.04
90～94	0.02	0.02	0.00	0.05	0.07	-0.02
95～99	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.07	0.03	-0.10	-0.05	-0.05	0.00
1～4	0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.02	0.01
5～9	0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00
10～14	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
15～19	-0.01	-0.03	0.02	0.00	0.01	-0.01
20～24	-0.05	-0.10	0.05	-0.01	-0.01	0.00
25～29	-0.07	-0.03	-0.04	-0.04	-0.01	-0.03
30～34	-0.05	-0.04	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
35～39	-0.08	-0.06	-0.02	-0.01	-0.02	0.01
40～44	-0.07	-0.09	0.02	-0.03	-0.04	0.01
45～49	-0.10	-0.10	0.00	-0.06	-0.06	0.00
50～54	-0.09	-0.14	0.05	-0.09	-0.08	-0.01
55～59	-0.21	-0.20	-0.01	-0.08	-0.06	-0.02
60～64	-0.26	-0.25	-0.01	-0.10	-0.06	-0.04
65～69	-0.28	-0.24	-0.04	-0.10	-0.10	0.00
70～74	-0.26	-0.25	-0.01	-0.08	-0.10	0.02
75～79	-0.28	-0.25	-0.03	-0.10	-0.08	-0.02
80～84	-0.20	-0.17	-0.03	-0.15	-0.12	-0.03
85～89	-0.12	-0.12	0.00	-0.18	-0.13	-0.05
90～94	-0.05	-0.05	0.00	-0.13	-0.10	-0.03
95～99	0.00	-0.01	0.01	-0.05	-0.04	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.39	-0.36	-0.03	-0.40	-0.33	-0.07
心疾患	0.05	0.00	0.05	0.00	-0.04	0.04
脳血管疾患	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.04	-0.04
肺炎	0.00	-0.04	0.04	0.00	0.01	-0.01
不慮の事故	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	0.01	-0.04
交通事故(再掲)	-0.02	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01
自殺	-0.06	-0.06	0.00	-0.04	0.00	-0.04
肝疾患	0.02	0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00
腎不全	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	-0.04	-0.01
糖尿病	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01
高血圧性疾患	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.02
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.08	0.05	0.03	0.19	0.16	0.03
新型コロナウイルス感染症	-0.03	...	...	-0.03	...	...
その他	-0.10	-0.06	-0.04	-0.12	-0.02	-0.10

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.74	-0.73	-0.01	-0.47	-0.39	-0.08
心疾患	-0.28	-0.26	-0.02	-0.15	-0.11	-0.04
脳血管疾患	-0.24	-0.26	0.02	-0.15	-0.21	0.06
肺炎	-0.16	-0.23	0.07	-0.10	-0.13	0.03
不慮の事故	-0.20	-0.20	0.00	-0.10	-0.08	-0.02
交通事故(再掲)	-0.02	-0.03	0.01	-0.01	-0.02	0.01
自殺	-0.15	-0.08	-0.07	0.01	0.02	-0.01
肝疾患	-0.06	-0.05	-0.01	0.02	-0.01	0.03
腎不全	-0.07	-0.07	0.00	-0.05	-0.06	0.01
糖尿病	-0.04	-0.07	0.03	-0.02	-0.04	0.02
高血圧性疾患	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.02
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.01	-0.02	0.01	-0.05	-0.04	-0.01
新型コロナウイルス感染症	0.05	...	...	0.02	...	...
その他	-0.33	-0.14	-0.19	-0.22	-0.04	-0.18

岩手県

宮城県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	岩手県	全国	地域差	岩手県	全国	地域差
令和2年	80.64	81.49	-0.86	87.05	87.60	-0.55
平成27年	79.86	80.77	-0.91	86.44	87.01	-0.57

	男			女		
	宮城県	全国	地域差	宮城県	全国	地域差
令和2年	81.70	81.49	0.20	87.51	87.60	-0.10
平成27年	80.99	80.77	0.22	87.16	87.01	0.15

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.02	0.00	0.02	0.01	-0.06	0.07
1～4	-0.01	-0.01	0.00	0.02	-0.02	0.04
5～9	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02
10～14	0.00	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
15～19	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.02
20～24	-0.01	-0.05	0.04	-0.02	-0.03	0.01
25～29	-0.02	-0.06	0.04	-0.03	-0.01	-0.02
30～34	-0.01	-0.08	0.07	-0.02	-0.03	0.01
35～39	-0.02	-0.05	0.03	0.02	-0.02	0.04
40～44	-0.06	-0.06	0.00	-0.04	-0.01	-0.03
45～49	-0.09	-0.03	-0.06	-0.04	-0.05	0.01
50～54	-0.07	-0.08	0.01	-0.05	-0.02	-0.03
55～59	-0.06	-0.07	0.01	-0.05	-0.06	0.01
60～64	-0.07	-0.13	0.06	-0.03	-0.04	0.01
65～69	-0.09	-0.06	-0.03	-0.04	-0.04	0.00
70～74	-0.06	-0.06	0.00	-0.04	-0.02	-0.02
75～79	-0.10	-0.07	-0.03	-0.04	0.02	-0.06
80～84	-0.08	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	0.00
85～89	-0.05	-0.04	-0.01	-0.07	-0.06	-0.01
90～94	-0.02	-0.02	0.00	-0.07	-0.04	-0.03
95～99	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.01
1～4	0.01	-0.02	0.03	0.00	-0.01	0.01
5～9	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
10～14	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
15～19	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01
20～24	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.03	-0.05
25～29	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	-0.03
30～34	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.03
35～39	-0.03	-0.04	0.01	-0.01	0.00	-0.01
40～44	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
45～49	-0.01	-0.04	0.03	-0.02	0.00	-0.02
50～54	0.00	-0.02	0.02	0.02	-0.02	0.04
55～59	0.03	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01
60～64	0.04	0.03	0.01	0.01	0.05	-0.04
65～69	0.08	0.08	0.00	0.01	0.06	-0.05
70～74	0.09	0.10	-0.01	0.02	0.02	0.00
75～79	0.05	0.04	0.01	0.01	0.03	-0.02
80～84	0.00	0.06	-0.06	-0.01	0.03	-0.04
85～89	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.02	-0.01
90～94	-0.01	0.02	-0.03	-0.04	-0.01	-0.03
95～99	0.00	0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.16	-0.04	-0.12	-0.20	-0.06	-0.14
心疾患	-0.27	-0.34	0.07	-0.15	-0.17	0.02
脳血管疾患	-0.37	-0.35	-0.02	-0.34	-0.33	-0.01
肺炎	0.02	0.02	0.00	0.04	0.06	-0.02
不慮の事故	-0.09	-0.17	0.08	-0.02	-0.07	0.05
交通事故(再掲)	-0.01	-0.07	0.06	0.00	-0.05	0.05
自殺	-0.10	-0.16	0.06	0.02	-0.05	0.07
肝疾患	-0.01	0.00	-0.01	0.03	0.01	0.02
腎不全	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
糖尿病	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.01
高血圧性疾患	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.00	0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.03	...	...
その他	0.12	0.10	0.02	0.09	0.04	0.05

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.01	0.09	-0.08	-0.03	0.10	-0.13
心疾患	-0.01	-0.02	0.01	-0.03	0.04	-0.07
脳血管疾患	-0.18	-0.13	-0.05	-0.17	-0.13	-0.04
肺炎	0.12	0.16	-0.04	0.10	0.14	-0.04
不慮の事故	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.03	-0.03
交通事故(再掲)	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.02	-0.01
自殺	-0.08	-0.06	-0.02	-0.03	0.00	-0.03
肝疾患	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01
腎不全	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	-0.01
糖尿病	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.00
高血圧性疾患	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
結核	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.04	-0.05	0.01	-0.06	-0.15	0.09
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.02	...	...
その他	0.26	0.16	0.10	0.06	0.09	-0.03

秋田県

山形県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	秋田県	全国	地域差	秋田県	全国	地域差
令和2年	80.48	81.49	-1.02	87.10	87.60	-0.50
平成27年	79.51	80.77	-1.26	86.38	87.01	-0.63

	男			女		
	山形県	全国	地域差	山形県	全国	地域差
令和2年	81.39	81.49	-0.11	87.38	87.60	-0.22
平成27年	80.52	80.77	-0.26	86.96	87.01	-0.05

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03
1～4	0.01	-0.02	0.03	-0.01	-0.03	0.02
5～9	0.00	-0.02	0.02	0.00	-0.02	0.02
10～14	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
15～19	0.00	0.02	-0.02	-0.01	-0.04	0.03
20～24	-0.04	-0.06	0.02	-0.01	-0.02	0.01
25～29	-0.06	-0.06	0.00	-0.01	-0.03	0.02
30～34	-0.02	-0.08	0.06	0.00	-0.03	0.03
35～39	-0.02	-0.04	0.02	-0.06	-0.05	-0.01
40～44	-0.05	-0.10	0.05	-0.03	-0.02	-0.01
45～49	-0.02	-0.12	0.10	-0.05	-0.07	0.02
50～54	-0.08	-0.11	0.03	-0.06	-0.01	-0.05
55～59	-0.02	-0.11	0.09	0.00	-0.02	0.02
60～64	-0.13	-0.10	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01
65～69	-0.09	-0.04	-0.05	-0.03	-0.03	0.00
70～74	-0.09	-0.13	0.04	0.01	-0.02	0.03
75～79	-0.17	-0.11	-0.06	0.00	0.00	0.00
80～84	-0.06	-0.08	0.02	0.01	-0.02	0.03
85～89	-0.08	-0.07	-0.01	-0.09	-0.07	-0.02
90～94	-0.06	-0.04	-0.02	-0.08	-0.10	0.02
95～99	-0.02	0.00	-0.02	-0.06	-0.05	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.02	-0.09	0.07	0.01	-0.01	0.02
1～4	-0.01	0.00	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01
5～9	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01
10～14	0.00	-0.03	0.03	-0.02	0.01	-0.03
15～19	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01
20～24	-0.06	-0.06	0.00	-0.06	-0.02	-0.04
25～29	-0.03	-0.08	0.05	0.00	0.01	-0.01
30～34	-0.05	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	0.02
35～39	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.02	-0.02
40～44	0.01	-0.01	0.02	-0.02	-0.02	0.00
45～49	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.02	-0.02
50～54	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.02
55～59	0.00	0.04	-0.04	0.03	0.02	0.01
60～64	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.04	-0.02
65～69	0.08	0.02	0.06	0.06	0.04	0.02
70～74	0.08	0.03	0.05	0.02	0.03	-0.01
75～79	0.04	0.01	0.03	0.01	0.04	-0.03
80～84	-0.03	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	-0.01
85～89	-0.04	-0.04	0.00	-0.08	-0.06	-0.02
90～94	-0.03	-0.03	0.00	-0.07	-0.07	0.00
95～99	-0.01	-0.01	0.00	-0.04	-0.03	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.46	-0.48	0.02	-0.13	-0.18	0.05
心疾患	0.16	0.03	0.13	0.14	0.05	0.09
脳血管疾患	-0.30	-0.25	-0.05	-0.26	-0.24	-0.02
肺炎	-0.05	-0.04	-0.01	0.01	0.04	-0.03
不慮の事故	-0.08	-0.11	0.03	-0.06	-0.09	0.03
交通事故(再掲)	0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
自殺	-0.02	-0.22	0.20	0.04	-0.06	0.10
肝疾患	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02	-0.03
腎不全	-0.04	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	-0.01
糖尿病	-0.03	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	0.02
高血圧性疾患	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01
結核	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.01	-0.01	0.00	0.04	-0.02	0.06
新型コロナウイルス感染症	0.05	...	...	0.03	...	...
その他	-0.24	-0.18	-0.06	-0.28	-0.15	-0.13

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.01	0.02	-0.01	0.05	0.07	-0.02
心疾患	-0.15	-0.01	-0.14	-0.08	0.03	-0.11
脳血管疾患	-0.11	-0.10	-0.01	-0.12	-0.20	0.08
肺炎	0.04	0.02	0.02	0.06	0.08	-0.02
不慮の事故	0.01	-0.05	0.06	-0.03	-0.01	-0.02
交通事故(再掲)	0.02	-0.03	0.05	-0.02	0.00	-0.02
自殺	-0.14	-0.12	-0.02	0.03	0.01	0.02
肝疾患	0.05	0.06	-0.01	0.00	0.01	-0.01
腎不全	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.01
糖尿病	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00
高血圧性疾患	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
結核	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.05	-0.07	0.02	-0.17	-0.09	-0.08
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.02	...	...
その他	0.14	-0.01	0.15	-0.03	0.04	-0.07

福島県

茨城県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	福島県	全国	地域差	福島県	全国	地域差
令和2年	80.60	81.49	-0.89	86.81	87.60	-0.79
平成27年	80.12	80.77	-0.65	86.40	87.01	-0.60

	男			女		
	茨城県	全国	地域差	茨城県	全国	地域差
令和2年	80.89	81.49	-0.60	86.94	87.60	-0.66
平成27年	80.28	80.77	-0.49	86.33	87.01	-0.68

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.06	-0.04	-0.02	-0.04	0.03	-0.07
1～4	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01
5～9	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
10～14	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
15～19	-0.01	-0.05	0.04	-0.03	-0.02	-0.01
20～24	-0.01	-0.07	0.06	-0.03	-0.01	-0.02
25～29	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	0.00	-0.03
30～34	-0.05	-0.04	-0.01	0.00	-0.02	0.02
35～39	-0.04	-0.05	0.01	-0.02	-0.01	-0.01
40～44	-0.06	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.00
45～49	-0.05	-0.01	-0.04	-0.02	-0.02	0.00
50～54	-0.06	-0.06	0.00	-0.04	-0.04	0.00
55～59	-0.08	-0.03	-0.05	-0.02	-0.01	-0.01
60～64	-0.07	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01
65～69	-0.06	-0.02	-0.04	-0.05	-0.09	0.04
70～74	-0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-0.05	0.02
75～79	-0.08	-0.04	-0.04	-0.09	-0.04	-0.05
80～84	-0.08	-0.04	-0.04	-0.07	-0.04	-0.03
85～89	-0.07	-0.06	-0.01	-0.09	-0.10	0.01
90～94	-0.02	-0.03	0.01	-0.09	-0.08	-0.01
95～99	-0.01	0.00	-0.01	-0.05	-0.04	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.04	-0.01	-0.03	-0.09	-0.05	-0.04
1～4	-0.01	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01
5～9	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
10～14	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.01
15～19	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	-0.01	-0.02
20～24	-0.03	-0.04	0.01	-0.02	-0.01	-0.01
25～29	-0.04	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02
30～34	-0.02	-0.03	0.01	0.00	-0.01	0.01
35～39	-0.01	-0.03	0.02	-0.01	-0.02	0.01
40～44	-0.04	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.01
45～49	-0.01	-0.03	0.02	-0.03	-0.04	0.01
50～54	-0.03	-0.04	0.01	0.00	-0.03	0.03
55～59	-0.07	-0.04	-0.03	-0.03	-0.05	0.02
60～64	-0.04	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
65～69	-0.05	-0.01	-0.04	0.00	-0.02	0.02
70～74	-0.04	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	0.03
75～79	-0.04	-0.04	0.00	-0.05	-0.05	0.00
80～84	-0.03	-0.07	0.04	-0.11	-0.10	-0.01
85～89	-0.05	-0.04	-0.01	-0.10	-0.08	-0.02
90～94	-0.01	-0.01	0.00	-0.09	-0.08	-0.01
95～99	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.03	0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.17	0.04	-0.21	-0.04	-0.05	0.01
心疾患	-0.19	-0.29	0.10	-0.16	-0.22	0.06
脳血管疾患	-0.14	-0.11	-0.03	-0.17	-0.21	0.04
肺炎	-0.01	0.03	-0.04	0.01	0.04	-0.03
不慮の事故	-0.13	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-0.02
交通事故(再掲)	-0.01	-0.03	0.02	-0.01	-0.02	0.01
自殺	-0.12	-0.12	0.00	-0.03	0.00	-0.03
肝疾患	-0.01	0.02	-0.03	-0.02	0.00	-0.02
腎不全	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
糖尿病	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	-0.02	-0.01
高血圧性疾患	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.04	-0.03	-0.01	-0.06	-0.08	0.02
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	-0.07	-0.08	0.01	-0.27	-0.02	-0.25

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.09	-0.08	-0.01	-0.07	-0.09	0.02
心疾患	-0.07	-0.05	-0.02	-0.06	-0.11	0.05
脳血管疾患	-0.19	-0.15	-0.04	-0.14	-0.15	0.01
肺炎	-0.09	-0.08	-0.01	-0.13	-0.13	0.00
不慮の事故	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.03	0.02
交通事故(再掲)	-0.02	-0.08	0.06	-0.01	-0.03	0.02
自殺	-0.07	-0.04	-0.03	0.00	-0.01	0.01
肝疾患	0.02	0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.00
腎不全	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.00	0.01
糖尿病	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	0.00
高血圧性疾患	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.01	-0.02	0.01	-0.05	-0.07	0.02
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.01	...	...
その他	-0.10	-0.05	-0.05	-0.20	-0.07	-0.13

栃木県

群馬県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	栃木県	全国	地域差	栃木県	全国	地域差
令和2年	81.00	81.49	-0.49	86.89	87.60	-0.71
平成27年	80.10	80.77	-0.67	86.24	87.01	-0.77

	男			女		
	群馬県	全国	地域差	群馬県	全国	地域差
令和2年	81.13	81.49	-0.36	87.18	87.60	-0.42
平成27年	80.61	80.77	-0.17	86.84	87.01	-0.17

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	0.01
1～4	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10～14	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00
15～19	-0.02	-0.04	0.02	0.00	-0.02	0.02
20～24	-0.03	-0.06	0.03	-0.02	-0.03	0.01
25～29	-0.01	0.00	-0.01	-0.04	0.00	-0.04
30～34	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	0.01	-0.03
35～39	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	-0.03	0.01
40～44	-0.01	-0.01	0.00	-0.04	-0.03	-0.01
45～49	-0.01	-0.05	0.04	-0.02	-0.01	-0.01
50～54	-0.08	-0.05	-0.03	0.00	-0.04	0.04
55～59	-0.06	-0.02	-0.04	-0.06	-0.01	-0.05
60～64	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	0.02
65～69	-0.01	-0.05	0.04	-0.02	-0.02	0.00
70～74	-0.05	-0.05	0.00	-0.03	-0.08	0.05
75～79	-0.02	-0.06	0.04	-0.08	-0.09	0.01
80～84	-0.04	-0.07	0.03	-0.11	-0.15	0.04
85～89	-0.03	-0.07	0.04	-0.13	-0.11	-0.02
90～94	-0.02	-0.02	0.00	-0.08	-0.06	-0.02
95～99	0.01	-0.01	0.02	-0.02	-0.03	0.01
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.02

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.04	0.05	-0.01	-0.05	0.03	-0.08
1～4	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01
5～9	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
10～14	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.00	0.01
15～19	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
20～24	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01
25～29	-0.02	-0.03	0.01	-0.01	-0.04	0.03
30～34	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00
35～39	-0.01	-0.01	0.00	-0.03	-0.01	-0.02
40～44	-0.04	0.01	-0.05	-0.01	-0.02	0.01
45～49	-0.02	-0.03	0.01	-0.02	0.00	-0.02
50～54	-0.02	-0.03	0.01	-0.01	0.05	-0.06
55～59	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.02	-0.02
60～64	0.01	0.03	-0.02	0.02	0.00	0.02
65～69	-0.04	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	0.03
70～74	-0.03	-0.03	0.00	-0.02	0.00	-0.02
75～79	-0.04	-0.04	0.00	-0.05	-0.03	-0.02
80～84	-0.08	-0.04	-0.04	-0.08	-0.06	-0.02
85～89	-0.04	-0.01	-0.03	-0.10	-0.05	-0.05
90～94	-0.01	0.01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02
95～99	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.02	-0.04	0.06	-0.06	-0.05	-0.01
心疾患	-0.21	-0.23	0.02	-0.12	-0.19	0.07
脳血管疾患	-0.21	-0.20	-0.01	-0.20	-0.25	0.05
肺炎	-0.02	-0.05	0.03	-0.01	-0.06	0.05
不慮の事故	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.03	-0.01
交通事故(再掲)	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.03	0.03
自殺	-0.04	-0.06	0.02	-0.07	0.00	-0.07
肝疾患	0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
腎不全	0.00	-0.03	0.03	0.00	-0.01	0.01
糖尿病	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.01
高血圧性疾患	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.02	-0.03	0.01	-0.12	-0.09	-0.03
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	-0.04	-0.06	0.02	-0.15	-0.12	-0.03

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.13	0.09	0.04	0.01	0.09	-0.08
心疾患	-0.10	-0.15	0.05	-0.08	-0.05	-0.03
脳血管疾患	-0.06	-0.05	-0.01	-0.06	-0.07	0.01
肺炎	-0.08	-0.07	-0.01	-0.07	-0.08	0.01
不慮の事故	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01
交通事故(再掲)	0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.01
自殺	-0.11	-0.09	-0.02	-0.05	-0.05	0.00
肝疾患	0.05	0.03	0.02	-0.01	-0.02	0.01
腎不全	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	-0.01
糖尿病	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01
高血圧性疾患	-0.14	-0.02	-0.12	-0.07	0.00	-0.07
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.03	0.02	0.01	0.08	0.03	0.05
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	-0.10	0.07	-0.17	-0.18	-0.03	-0.15

埼玉県

千葉県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	埼玉県	全国	地域差	埼玉県	全国	地域差
令和2年	81.44	81.49	-0.06	87.31	87.60	-0.29
平成27年	80.82	80.77	0.04	86.66	87.01	-0.34

	男			女		
	千葉県	全国	地域差	千葉県	全国	地域差
令和2年	81.45	81.49	-0.05	87.50	87.60	-0.10
平成27年	80.96	80.77	0.19	86.91	87.01	-0.10

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.01	-0.01	0.02	0.03	0.00	0.03
1～4	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02
5～9	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01
10～14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15～19	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.01
20～24	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01
25～29	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
30～34	0.02	0.00	0.02	-0.01	0.00	-0.01
35～39	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
40～44	0.01	0.00	0.01	-0.03	0.00	-0.03
45～49	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
50～54	-0.02	0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.01
55～59	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.01	-0.03
60～64	-0.02	0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01
65～69	0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.00
70～74	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
75～79	-0.03	-0.01	-0.02	-0.04	-0.06	0.02
80～84	-0.01	-0.02	0.01	-0.07	-0.07	0.00
85～89	-0.02	-0.01	-0.01	-0.06	-0.10	0.04
90～94	-0.01	-0.01	0.00	-0.03	-0.04	0.01
95～99	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	-0.03	0.00	-0.03	-0.01	-0.03	0.02
1～4	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02
5～9	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
10～14	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01
15～19	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.01
20～24	0.01	-0.01	0.02	0.00	-0.01	0.01
25～29	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
30～34	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
35～39	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
40～44	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.02	0.02
45～49	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
50～54	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01
55～59	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.02
60～64	-0.03	0.04	-0.07	0.00	-0.01	0.01
65～69	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.02	-0.02
70～74	0.01	0.05	-0.04	0.00	0.03	-0.03
75～79	0.00	0.05	-0.05	0.01	0.02	-0.01
80～84	0.02	0.06	-0.04	0.00	-0.03	0.03
85～89	0.02	0.02	0.00	-0.03	-0.03	0.00
90～94	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.04	0.02
95～99	0.00	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.04	0.04	0.00	-0.04	-0.04	0.00
心疾患	-0.13	-0.14	0.01	-0.14	-0.18	0.04
脳血管疾患	0.04	0.02	0.02	0.01	-0.01	0.02
肺炎	-0.11	-0.13	0.02	-0.10	-0.14	0.04
不慮の事故	0.10	0.11	-0.01	0.05	0.07	-0.02
交通事故(再掲)	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.01
自殺	0.05	0.02	0.03	-0.02	-0.01	-0.01
肝疾患	0.04	0.04	0.00	0.00	-0.01	0.01
腎不全	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
糖尿病	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
高血圧性疾患	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.01	0.02	-0.03	-0.02	0.00	-0.02
新型コロナウイルス感染症	-0.02	...	...	-0.01	...	...
その他	-0.08	0.04	-0.12	-0.03	-0.02	-0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.06	0.12	-0.06	0.02	0.06	-0.04
心疾患	-0.13	-0.28	0.15	-0.09	-0.22	0.13
脳血管疾患	0.00	0.03	-0.03	0.00	-0.01	0.01
肺炎	-0.05	-0.04	-0.01	-0.06	-0.08	0.02
不慮の事故	0.06	0.07	-0.01	0.05	0.05	0.00
交通事故(再掲)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自殺	0.02	-0.02	0.04	-0.03	-0.02	-0.01
肝疾患	0.04	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00
腎不全	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.02	0.00
糖尿病	-0.03	0.01	-0.04	-0.01	0.01	-0.02
高血圧性疾患	-0.09	-0.01	-0.08	-0.06	-0.01	-0.05
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.02	-0.02	0.00	-0.07	-0.07	0.00
新型コロナウイルス感染症	-0.01	...	...	0.00	...	...
その他	0.10	0.27	-0.17	0.14	0.17	-0.03

東京都

神奈川県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	東京都	全国	地域差	東京都	全国	地域差
令和2年	81.77	81.49	0.27	87.86	87.60	0.25
平成27年	81.07	80.77	0.29	87.26	87.01	0.25

	男			女		
	神奈川県	全国	地域差	神奈川県	全国	地域差
令和2年	82.04	81.49	0.54	87.89	87.60	0.29
平成27年	81.32	80.77	0.54	87.24	87.01	0.23

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00
1～4	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10～14	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	-0.01
15～19	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01
20～24	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00
25～29	0.04	0.04	0.00	0.00	0.01	-0.01
30～34	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00
35～39	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00
40～44	0.03	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01
45～49	0.02	0.03	-0.01	0.02	0.01	0.01
50～54	0.02	0.03	-0.01	0.01	0.00	0.01
55～59	0.03	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01
60～64	0.00	-0.02	0.02	-0.01	-0.01	0.00
65～69	-0.03	-0.04	0.01	-0.02	0.00	-0.02
70～74	-0.04	-0.05	0.01	-0.01	0.01	-0.02
75～79	-0.03	0.00	-0.03	-0.01	0.02	-0.03
80～84	0.00	0.06	-0.06	0.04	0.04	0.00
85～89	0.05	0.06	-0.01	0.07	0.05	0.02
90～94	0.04	0.02	0.02	0.07	0.03	0.04
95～99	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.02	-0.01	0.03	0.01	0.01	0.00
1～4	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
5～9	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
10～14	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
15～19	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
20～24	0.02	0.03	-0.01	0.02	0.00	0.02
25～29	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
30～34	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.01
35～39	0.01	0.03	-0.02	0.00	0.00	0.00
40～44	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
45～49	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00
50～54	0.03	0.04	-0.01	0.02	0.00	0.02
55～59	0.03	0.04	-0.01	0.01	0.00	0.01
60～64	0.04	0.04	0.00	0.00	-0.01	0.01
65～69	0.04	0.03	0.01	-0.01	0.01	-0.02
70～74	0.05	0.04	0.01	0.01	0.02	-0.01
75～79	0.05	0.05	0.00	0.04	0.03	0.01
80～84	0.06	0.07	-0.01	0.03	0.02	0.01
85～89	0.06	0.05	0.01	0.05	0.02	0.03
90～94	0.05	0.03	0.02	0.05	0.05	0.00
95～99	0.01	0.01	0.00	0.03	0.04	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.08	0.03	0.05	0.00	-0.05	0.05
心疾患	0.00	0.06	-0.06	0.05	0.07	-0.02
脳血管疾患	0.02	0.04	-0.02	0.05	0.07	-0.02
肺炎	0.02	0.03	-0.01	0.03	0.04	-0.01
不慮の事故	0.10	0.15	-0.05	0.05	0.08	-0.03
交通事故(再掲)	0.04	0.06	-0.02	0.02	0.03	-0.01
自殺	0.08	0.07	0.01	-0.03	-0.02	-0.01
肝疾患	-0.05	-0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
腎不全	0.01	0.02	-0.01	0.03	0.03	0.00
糖尿病	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
高血圧性疾患	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03
新型コロナウイルス感染症	-0.05	...	...	-0.03	...	...
その他	0.04	-0.05	0.09	0.11	0.03	0.08

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.12	0.09	0.03	0.03	-0.02	0.05
心疾患	-0.09	0.01	-0.10	0.08	0.11	-0.03
脳血管疾患	0.08	0.04	0.04	0.06	0.06	0.00
肺炎	0.07	0.09	-0.02	0.07	0.08	-0.01
不慮の事故	0.03	0.04	-0.01	-0.02	-0.03	0.01
交通事故(再掲)	0.02	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.00
自殺	0.06	0.09	-0.03	0.00	0.00	0.00
肝疾患	-0.06	-0.04	-0.02	0.00	0.01	-0.01
腎不全	0.03	0.04	-0.01	0.03	0.04	-0.01
糖尿病	0.03	0.03	0.00	0.02	0.02	0.00
高血圧性疾患	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.09	-0.04	-0.05	-0.21	-0.15	-0.06
新型コロナウイルス感染症	-0.01	...	...	0.00	...	...
その他	0.33	0.17	0.16	0.20	0.10	0.10

新潟県

富山県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	新潟県	全国	地域差	新潟県	全国	地域差
令和2年	81.29	81.49	-0.20	87.57	87.60	-0.03
平成27年	80.69	80.77	-0.09	87.32	87.01	0.31

	男			女		
	富山県	全国	地域差	富山県	全国	地域差
令和2年	81.74	81.49	0.25	87.97	87.60	0.37
平成27年	80.61	80.77	-0.16	87.42	87.01	0.42

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	-0.03
1～4	0.01	0.02	-0.01	-0.02	0.00	-0.02
5～9	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
10～14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
15～19	0.02	0.00	0.02	-0.01	-0.01	0.00
20～24	-0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.03	0.03
25～29	-0.03	0.00	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01
30～34	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01
35～39	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01
40～44	0.00	-0.03	0.03	0.00	-0.01	0.01
45～49	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01
50～54	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	0.03	-0.05
55～59	0.01	-0.02	0.03	0.02	0.03	-0.01
60～64	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	-0.03
65～69	0.00	0.04	-0.04	0.06	0.06	0.00
70～74	0.02	0.00	0.02	0.04	0.05	-0.01
75～79	-0.01	0.03	-0.04	0.02	0.07	-0.05
80～84	-0.03	-0.04	0.01	0.02	0.05	-0.03
85～89	-0.08	-0.03	-0.05	-0.05	0.01	-0.06
90～94	-0.03	-0.01	-0.02	-0.07	0.01	-0.08
95～99	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.00	0.02	-0.02	0.03	-0.02	0.05
1～4	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
5～9	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
10～14	0.02	-0.02	0.04	0.01	-0.01	0.02
15～19	0.03	-0.02	0.05	0.01	0.00	0.01
20～24	0.00	-0.06	0.06	0.01	-0.01	0.02
25～29	-0.04	-0.04	0.00	0.04	-0.01	0.05
30～34	0.01	-0.05	0.06	-0.04	0.00	-0.04
35～39	0.00	-0.04	0.04	0.04	0.00	0.04
40～44	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00
45～49	-0.01	0.03	-0.04	0.02	0.05	-0.03
50～54	0.01	0.02	-0.01	0.03	-0.01	0.04
55～59	0.06	0.06	0.00	0.02	0.03	-0.01
60～64	0.12	0.05	0.07	0.03	0.05	-0.02
65～69	0.07	0.06	0.01	0.01	0.06	-0.05
70～74	0.04	0.04	0.00	0.06	0.05	0.01
75～79	0.04	-0.04	0.08	0.00	0.08	-0.08
80～84	-0.04	-0.09	0.05	-0.01	0.05	-0.06
85～89	-0.05	-0.04	-0.01	0.02	0.01	0.01
90～94	-0.02	-0.02	0.00	0.03	0.06	-0.03
95～99	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.02	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.02

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.13	-0.09	-0.04	0.07	0.13	-0.06
心疾患	0.13	0.06	0.07	0.13	0.15	-0.02
脳血管疾患	-0.16	-0.17	0.01	-0.14	-0.14	0.00
肺炎	0.10	0.09	0.01	0.10	0.14	-0.04
不慮の事故	-0.03	-0.09	0.06	-0.04	-0.07	0.03
交通事故(再掲)	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.01
自殺	-0.09	-0.12	0.03	-0.02	-0.03	0.01
肝疾患	0.04	0.04	0.00	0.03	0.04	-0.01
腎不全	0.01	0.04	-0.03	0.01	0.03	-0.02
糖尿病	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
高血圧性疾患	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.07	-0.06	-0.01	-0.09	-0.07	-0.02
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.03	...	...
その他	-0.05	0.18	-0.23	-0.11	0.12	-0.23

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.10	0.01	0.09	0.06	0.12	-0.06
心疾患	0.30	0.21	0.09	0.21	0.22	-0.01
脳血管疾患	-0.08	-0.09	0.01	-0.06	-0.04	-0.02
肺炎	-0.01	-0.07	0.06	0.05	0.02	0.03
不慮の事故	-0.11	-0.17	0.06	-0.09	-0.11	0.02
交通事故(再掲)	0.01	-0.02	0.03	0.00	-0.02	0.02
自殺	-0.08	-0.14	0.06	0.05	-0.01	0.06
肝疾患	0.05	0.04	0.01	0.00	0.02	-0.02
腎不全	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	-0.01
糖尿病	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
高血圧性疾患	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.00	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.01	0.02	-0.03	-0.02	0.06	-0.08
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.02	...	...
その他	0.04	0.05	-0.01	0.09	0.09	0.00

石川県

福井県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	石川県	全国	地域差	石川県	全国	地域差
令和2年	82.00	81.49	0.51	88.11	87.60	0.50
平成27年	81.04	80.77	0.27	87.28	87.01	0.27

	男			女		
	福井県	全国	地域差	福井県	全国	地域差
令和2年	81.98	81.49	0.49	87.84	87.60	0.23
平成27年	81.27	80.77	0.50	87.54	87.01	0.53

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.01	0.01
1～4	0.00	0.01	-0.01	0.02	-0.02	0.04
5～9	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.02
10～14	-0.01	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
15～19	0.03	-0.03	0.06	0.02	0.00	0.02
20～24	0.04	-0.01	0.05	0.01	0.03	-0.02
25～29	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
30～34	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
35～39	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
40～44	0.04	0.04	0.00	0.03	0.02	0.01
45～49	0.02	0.05	-0.03	0.03	0.02	0.01
50～54	0.06	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03
55～59	0.05	0.03	0.02	0.07	0.03	0.04
60～64	0.10	0.09	0.01	0.04	0.02	0.02
65～69	0.10	0.05	0.05	0.07	0.02	0.05
70～74	0.08	0.02	0.06	0.02	-0.03	0.05
75～79	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	0.01
80～84	-0.02	-0.06	0.04	0.02	0.05	-0.03
85～89	-0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.04	-0.04
90～94	0.00	0.03	-0.03	0.02	0.02	0.00
95～99	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.04	0.01	-0.05	-0.11	-0.03	-0.08
1～4	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.04	-0.04
5～9	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.02	-0.02
10～14	-0.03	0.00	-0.03	-0.01	-0.01	0.00
15～19	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00
20～24	0.02	-0.02	0.04	-0.02	-0.01	-0.01
25～29	-0.03	-0.05	0.02	0.00	-0.01	0.01
30～34	0.00	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
35～39	0.04	0.03	0.01	0.02	0.02	0.00
40～44	0.04	0.07	-0.03	0.01	0.04	-0.03
45～49	0.05	0.04	0.01	0.02	0.05	-0.03
50～54	0.08	0.01	0.07	0.02	0.08	-0.06
55～59	0.11	0.01	0.10	0.04	0.03	0.01
60～64	0.08	0.11	-0.03	0.10	0.04	0.06
65～69	0.13	0.10	0.03	0.08	0.06	0.02
70～74	0.14	0.10	0.04	0.06	0.03	0.03
75～79	0.03	0.02	0.01	0.06	0.09	-0.03
80～84	-0.01	0.05	-0.06	-0.01	0.03	-0.04
85～89	-0.04	0.02	-0.06	-0.02	0.05	-0.07
90～94	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.01	-0.01
95～99	0.00	0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.00
100～	0.00	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.06	-0.01	0.07	0.04	0.05	-0.01
心疾患	0.14	0.15	-0.01	0.08	0.04	0.04
脳血管疾患	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.02	0.02
肺炎	0.01	-0.02	0.03	0.04	0.02	0.02
不慮の事故	-0.05	-0.12	0.07	0.00	-0.08	0.08
交通事故(再掲)	-0.01	-0.02	0.01	0.01	-0.02	0.03
自殺	0.05	-0.02	0.07	0.05	0.08	-0.03
肝疾患	0.04	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00
腎不全	0.02	0.04	-0.02	0.01	0.03	-0.02
糖尿病	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.00
高血圧性疾患	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.06	0.04	0.02	0.13	0.05	0.08
新型コロナウイルス感染症	0.02	...	...	0.01	...	...
その他	0.14	0.16	-0.02	0.12	0.08	0.04

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.20	0.25	-0.05	0.32	0.12	0.20
心疾患	-0.02	0.05	-0.07	-0.08	0.08	-0.16
脳血管疾患	0.04	0.03	0.01	-0.04	0.07	-0.11
肺炎	-0.04	0.04	-0.08	-0.01	0.03	-0.04
不慮の事故	-0.08	-0.13	0.05	-0.07	-0.10	0.03
交通事故(再掲)	0.00	-0.04	0.04	-0.03	-0.01	-0.02
自殺	-0.01	0.01	-0.02	0.05	0.10	-0.05
肝疾患	0.10	0.03	0.07	0.03	0.02	0.01
腎不全	0.01	-0.01	0.02	-0.01	-0.02	0.01
糖尿病	-0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.00	-0.01
高血圧性疾患	0.03	0.01	0.02	0.00	0.01	-0.01
結核	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01
老衰	0.05	0.03	0.02	0.11	0.06	0.05
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.02	...	...
その他	0.16	0.20	-0.04	-0.07	0.16	-0.23

山梨県

長野県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	山梨県	全国	地域差	山梨県	全国	地域差
令和2年	81.71	81.49	0.22	87.94	87.60	0.34
平成27年	80.85	80.77	0.07	87.22	87.01	0.21

	男			女		
	長野県	全国	地域差	長野県	全国	地域差
令和2年	82.68	81.49	1.19	88.23	87.60	0.63
平成27年	81.75	80.77	0.98	87.675	87.01	0.67

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.02	0.02	-0.04	0.02	0.01	0.01
1～4	-0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.02	0.03
5～9	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.02
10～14	0.00	0.02	-0.02	0.02	0.00	0.02
15～19	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.02	-0.03
20～24	-0.03	-0.04	0.01	-0.01	0.00	-0.01
25～29	-0.01	-0.05	0.04	-0.01	-0.01	0.00
30～34	0.02	-0.01	0.03	-0.02	0.02	-0.04
35～39	0.00	-0.03	0.03	0.01	0.01	0.00
40～44	0.00	-0.02	0.02	-0.03	0.01	-0.04
45～49	0.01	-0.02	0.03	0.03	0.01	0.02
50～54	-0.04	-0.02	-0.02	0.02	-0.02	0.04
55～59	-0.01	-0.03	0.02	0.00	0.07	-0.07
60～64	0.02	0.09	-0.07	0.02	0.00	0.02
65～69	0.07	0.02	0.05	0.03	0.00	0.03
70～74	0.06	0.01	0.05	0.05	-0.02	0.07
75～79	0.06	0.07	-0.01	0.04	0.02	0.02
80～84	0.05	0.01	0.04	0.07	0.02	0.05
85～89	0.03	0.07	-0.04	0.04	0.04	0.00
90～94	0.01	0.01	0.00	0.01	0.08	-0.07
95～99	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
100～	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.01	0.03	-0.02	0.05	0.04	0.01
1～4	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01
5～9	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01
10～14	0.00	-0.02	0.02	0.00	-0.01	0.01
15～19	-0.03	-0.01	-0.02	0.01	-0.02	0.03
20～24	-0.04	-0.03	-0.01	-0.07	0.01	-0.08
25～29	0.00	-0.05	0.05	-0.01	0.00	-0.01
30～34	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.01
35～39	-0.03	0.00	-0.03	0.02	0.00	0.02
40～44	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	-0.02
45～49	0.07	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00
50～54	0.05	0.04	0.01	-0.01	0.02	-0.03
55～59	0.12	0.08	0.04	0.03	0.04	-0.01
60～64	0.14	0.13	0.01	0.05	0.07	-0.02
65～69	0.16	0.15	0.01	0.07	0.09	-0.02
70～74	0.20	0.13	0.07	0.12	0.07	0.05
75～79	0.21	0.17	0.04	0.13	0.09	0.04
80～84	0.17	0.14	0.03	0.09	0.09	0.00
85～89	0.11	0.09	0.02	0.08	0.10	-0.02
90～94	0.03	0.04	-0.01	0.06	0.04	0.02
95～99	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.27	0.27	0.00	0.18	0.14	0.04
心疾患	0.20	0.15	0.05	0.14	0.21	-0.07
脳血管疾患	-0.03	-0.09	0.06	-0.02	-0.07	0.05
肺炎	0.02	0.03	-0.01	0.05	0.12	-0.07
不慮の事故	-0.10	-0.13	0.03	0.00	-0.04	0.04
交通事故(再掲)	-0.02	-0.05	0.03	0.01	0.00	0.01
自殺	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	-0.03
肝疾患	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
腎不全	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
糖尿病	-0.02	-0.04	0.02	0.00	-0.02	0.02
高血圧性疾患	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.02	-0.05	0.07	0.02	-0.11	0.13
新型コロナウイルス感染症	0.05	...	...	0.02	...	...
その他	-0.17	-0.07	-0.10	-0.06	-0.06	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.55	0.63	-0.08	0.22	0.26	-0.04
心疾患	0.21	0.12	0.09	0.19	0.20	-0.01
脳血管疾患	-0.01	-0.06	0.05	-0.08	-0.12	0.04
肺炎	0.17	0.25	-0.08	0.12	0.19	-0.07
不慮の事故	-0.02	-0.06	0.04	0.00	-0.02	0.02
交通事故(再掲)	0.01	-0.01	0.02	0.01	-0.01	0.02
自殺	-0.09	-0.10	0.01	-0.01	-0.02	0.01
肝疾患	0.07	0.02	0.05	0.03	0.02	0.01
腎不全	0.04	0.04	0.00	0.05	0.04	0.01
糖尿病	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
高血圧性疾患	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01
老衰	-0.03	-0.04	0.01	-0.03	-0.06	0.03
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.03	...	...
その他	0.22	0.13	0.09	0.09	0.15	-0.06

岐阜県

静岡県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	岐阜県	全国	地域差	岐阜県	全国	地域差
令和2年	81.90	81.49	0.41	87.51	87.60	-0.09
平成27年	81.00	80.77	0.23	86.82	87.01	-0.19

	男			女		
	静岡県	全国	地域差	静岡県	全国	地域差
令和2年	81.59	81.49	0.09	87.48	87.60	-0.12
平成27年	80.95	80.77	0.18	87.10	87.01	0.09

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.00	0.03	-0.03	-0.01	-0.08	0.07
1～4	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
5～9	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
10～14	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01
15～19	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.01	0.01
20～24	0.00	-0.02	0.02	-0.01	-0.02	0.01
25～29	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.01
30～34	0.00	-0.01	0.01	0.02	0.00	0.02
35～39	0.01	-0.02	0.03	-0.01	0.00	-0.01
40～44	0.03	-0.01	0.04	0.02	0.01	0.01
45～49	0.01	0.05	-0.04	0.00	0.01	-0.01
50～54	0.03	0.06	-0.03	0.00	0.02	-0.02
55～59	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00
60～64	0.11	0.09	0.02	0.01	0.04	-0.03
65～69	0.11	0.08	0.03	0.03	0.02	0.01
70～74	0.09	0.03	0.06	0.03	0.00	0.03
75～79	0.08	0.02	0.06	0.00	-0.04	0.04
80～84	0.00	-0.01	0.01	-0.04	-0.06	0.02
85～89	-0.07	-0.05	-0.02	-0.08	-0.05	-0.03
90～94	-0.03	-0.04	0.01	-0.06	-0.03	-0.03
95～99	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.02	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.04	0.01	-0.05	-0.04	0.01	-0.05
1～4	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01
5～9	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
10～14	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
15～19	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.02
20～24	-0.02	-0.03	0.01	0.00	0.02	-0.02
25～29	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
30～34	0.00	-0.02	0.02	-0.02	0.01	-0.03
35～39	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
40～44	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
45～49	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
50～54	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
55～59	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
60～64	0.05	0.05	0.00	0.00	0.02	-0.02
65～69	0.04	0.07	-0.03	0.02	0.02	0.00
70～74	0.03	0.05	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
75～79	0.02	0.02	0.00	-0.02	0.01	-0.03
80～84	0.02	0.00	0.02	-0.02	0.01	-0.03
85～89	-0.01	-0.01	0.00	-0.03	0.00	-0.03
90～94	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	0.01	-0.04
95～99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.17	0.17	0.00	0.00	0.04	-0.04
心疾患	0.12	-0.04	0.16	0.01	-0.05	0.06
脳血管疾患	0.08	0.06	0.02	0.02	-0.04	0.06
肺炎	0.03	0.07	-0.04	0.02	0.04	-0.02
不慮の事故	-0.10	-0.08	-0.02	-0.07	-0.07	0.00
交通事故(再掲)	0.01	-0.02	0.03	-0.02	-0.02	0.00
自殺	0.00	-0.04	0.04	0.01	0.00	0.01
肝疾患	0.08	0.04	0.04	0.02	0.02	0.00
腎不全	0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.01
糖尿病	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00
高血圧性疾患	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.00
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.06	-0.05	-0.01	-0.13	-0.12	-0.01
新型コロナウイルス感染症	0.02	...	...	0.01	...	...
その他	-0.01	0.05	-0.06	-0.02	-0.03	0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.16	0.17	-0.01	0.07	0.14	-0.07
心疾患	0.07	0.10	-0.03	0.07	0.10	-0.03
脳血管疾患	-0.14	-0.11	-0.03	-0.11	-0.09	-0.02
肺炎	0.08	0.12	-0.04	0.05	0.12	-0.07
不慮の事故	0.00	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
交通事故(再掲)	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01
自殺	-0.04	-0.05	0.01	0.03	0.03	0.00
肝疾患	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	-0.01
腎不全	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01
糖尿病	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01
高血圧性疾患	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.18	-0.13	-0.05	-0.33	-0.25	-0.08
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	0.06	0.06	0.00	0.08	0.05	0.03

愛知県

三重県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	愛知県	全国	地域差	愛知県	全国	地域差
令和2年	81.77	81.49	0.28	87.52	87.60	-0.08
平成27年	81.10	80.77	0.33	86.86	87.01	-0.15

	男			女		
	三重県	全国	地域差	三重県	全国	地域差
令和2年	81.68	81.49	0.18	87.59	87.60	-0.01
平成27年	80.86	80.77	0.08	86.99	87.01	-0.02

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
1～4	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
5～9	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
10～14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15～19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
20～24	0.00	0.02	-0.02	0.01	0.01	0.00
25～29	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
30～34	0.02	0.03	-0.01	0.00	0.00	0.00
35～39	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
40～44	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
45～49	0.03	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
50～54	0.06	0.06	0.00	0.02	0.01	0.01
55～59	0.07	0.07	0.00	0.02	0.01	0.01
60～64	0.06	0.06	0.00	0.01	0.01	0.00
65～69	0.05	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00
70～74	0.02	0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
75～79	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.03	0.02
80～84	-0.01	-0.02	0.01	-0.03	-0.06	0.03
85～89	-0.03	-0.03	0.00	-0.07	-0.07	0.00
90～94	-0.03	0.00	-0.03	-0.04	-0.06	0.02
95～99	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	-0.01
1～4	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.03	-0.02
5～9	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.02	-0.02
10～14	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
15～19	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
20～24	-0.02	-0.04	0.02	0.00	0.00	0.00
25～29	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01
30～34	0.02	0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.00
35～39	-0.01	-0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
40～44	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.02	-0.02
45～49	0.04	0.01	0.03	0.02	0.02	0.00
50～54	0.01	0.02	-0.01	0.04	0.02	0.02
55～59	0.02	0.03	-0.01	0.03	0.04	-0.01
60～64	0.04	0.06	-0.02	0.04	0.02	0.02
65～69	0.07	0.06	0.01	0.03	0.01	0.02
70～74	0.05	0.05	0.00	0.00	0.02	-0.02
75～79	0.05	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.02
80～84	-0.01	-0.06	0.05	-0.05	-0.04	-0.01
85～89	-0.05	-0.02	-0.03	-0.07	-0.10	0.03
90～94	-0.04	-0.02	-0.02	-0.08	-0.06	-0.02
95～99	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.09	0.11	-0.02	0.00	-0.02	0.02
心疾患	0.35	0.28	0.07	0.18	0.10	0.08
脳血管疾患	0.08	0.08	0.00	0.03	0.03	0.00
肺炎	0.03	0.05	-0.02	0.03	0.05	-0.02
不慮の事故	0.04	0.02	0.02	-0.01	0.00	-0.01
交通事故(再掲)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
自殺	0.04	0.07	-0.03	0.03	0.03	0.00
肝疾患	0.06	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00
腎不全	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
糖尿病	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
高血圧性疾患	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
結核	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.11	-0.06	-0.05	-0.24	-0.14	-0.10
新型コロナウイルス感染症	0.00	...	...	0.00	...	...
その他	-0.38	-0.30	-0.08	-0.16	-0.22	0.06

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.16	0.20	-0.04	0.19	0.26	-0.07
心疾患	0.03	0.01	0.02	-0.01	0.03	-0.04
脳血管疾患	-0.01	0.03	-0.04	-0.01	-0.04	0.03
肺炎	0.02	0.00	0.02	0.02	0.03	-0.01
不慮の事故	0.00	-0.08	0.08	-0.01	-0.03	0.02
交通事故(再掲)	-0.04	-0.06	0.02	-0.03	-0.01	-0.02
自殺	0.02	-0.02	0.04	0.02	0.01	0.01
肝疾患	0.06	0.06	0.00	0.02	0.01	0.01
腎不全	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.02	0.01
糖尿病	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
高血圧性疾患	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.12	-0.09	-0.03	-0.28	-0.22	-0.06
新型コロナウイルス感染症	0.02	...	...	0.01	...	...
その他	0.01	-0.02	0.03	0.05	-0.04	0.09

滋賀県

京都府

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	滋賀県	全国	地域差	滋賀県	全国	地域差
令和2年	82.73	81.49	1.24	88.26	87.60	0.66
平成27年	81.78	80.77	1.00	87.57	87.01	0.57

	男			女		
	京都府	全国	地域差	京都府	全国	地域差
令和2年	82.24	81.49	0.75	88.25	87.60	0.64
平成27年	81.40	80.77	0.63	87.35	87.01	0.35

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.01	0.04	-0.03	0.00	0.01	-0.01
1～4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
10～14	-0.01	0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00
15～19	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
20～24	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
25～29	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
30～34	0.00	0.04	-0.04	0.01	0.01	0.00
35～39	0.01	0.03	-0.02	0.00	0.01	-0.01
40～44	0.04	0.04	0.00	0.01	0.04	-0.03
45～49	0.05	0.05	0.00	0.05	0.04	0.01
50～54	0.11	0.12	-0.01	0.06	0.04	0.02
55～59	0.13	0.13	0.00	0.10	0.03	0.07
60～64	0.17	0.16	0.01	0.06	0.07	-0.01
65～69	0.19	0.18	0.01	0.10	0.08	0.02
70～74	0.18	0.11	0.07	0.08	0.01	0.07
75～79	0.19	0.12	0.07	0.09	0.07	0.02
80～84	0.11	0.05	0.06	0.08	0.08	0.00
85～89	0.05	-0.01	0.06	0.02	0.04	-0.02
90～94	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.02	-0.01
95～99	0.01	-0.01	0.02	-0.02	-0.02	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.04	0.00	0.04	0.02	-0.03	0.05
1～4	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10～14	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
15～19	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.02	0.00
20～24	0.02	0.03	-0.01	0.00	0.02	-0.02
25～29	0.00	0.02	-0.02	0.02	0.00	0.02
30～34	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.00	0.02
35～39	-0.01	0.03	-0.04	0.01	0.02	-0.01
40～44	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.01
45～49	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01
50～54	0.04	0.06	-0.02	0.03	0.02	0.01
55～59	0.05	0.08	-0.03	0.06	0.05	0.01
60～64	0.10	0.04	0.06	0.05	0.05	0.00
65～69	0.11	0.04	0.07	0.05	0.02	0.03
70～74	0.09	0.07	0.02	0.05	0.06	-0.01
75～79	0.10	0.07	0.03	0.05	0.00	0.05
80～84	0.06	0.04	0.02	0.06	0.01	0.05
85～89	0.06	0.03	0.03	0.08	0.04	0.04
90～94	0.03	0.01	0.02	0.06	0.03	0.03
95～99	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.27	0.24	0.03	0.24	0.15	0.09
心疾患	0.18	0.09	0.09	0.04	-0.01	0.05
脳血管疾患	0.14	0.19	-0.05	0.10	0.12	-0.02
肺炎	0.14	0.10	0.04	0.10	0.10	0.00
不慮の事故	-0.04	-0.06	0.02	-0.03	-0.05	0.02
交通事故(再掲)	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	0.00
自殺	-0.01	0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00
肝疾患	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01
腎不全	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
糖尿病	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00
高血圧性疾患	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.03	0.02	0.01	0.04	0.10	-0.06
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	0.36	0.30	0.06	0.10	0.12	-0.02

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.12	0.06	0.06	0.09	0.02	0.07
心疾患	-0.08	-0.06	-0.02	-0.07	-0.09	0.02
脳血管疾患	0.08	0.09	-0.01	0.10	0.09	0.01
肺炎	0.10	0.09	0.01	0.08	0.04	0.04
不慮の事故	0.08	0.11	-0.03	0.09	0.11	-0.02
交通事故(再掲)	-0.02	0.01	-0.03	-0.01	0.01	-0.02
自殺	0.08	0.06	0.02	0.05	0.01	0.04
肝疾患	0.03	0.03	0.00	0.01	0.02	-0.01
腎不全	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
糖尿病	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
高血圧性疾患	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.00
結核	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.06	0.04	0.02	0.06	0.07	-0.01
新型コロナウイルス感染症	0.01	...	...	0.01	...	...
その他	0.20	0.18	0.02	0.17	0.06	0.11

大阪府

兵庫県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	大阪府	全国	地域差	大阪府	全国	地域差
令和2年	80.81	81.49	-0.69	87.37	87.60	-0.24
平成27年	80.23	80.77	-0.54	86.73	87.01	-0.28

	男			女		
	兵庫県	全国	地域差	兵庫県	全国	地域差
令和2年	81.72	81.49	0.23	87.90	87.60	0.30
平成27年	80.92	80.77	0.15	87.07	87.01	0.06

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.00
1～4	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00
5～9	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
10～14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15～19	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00
20～24	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
25～29	0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.01
30～34	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01
35～39	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
40～44	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
45～49	-0.03	-0.03	0.00	-0.01	0.00	-0.01
50～54	-0.04	-0.04	0.00	-0.02	0.00	-0.02
55～59	-0.07	-0.05	-0.02	-0.02	0.00	0.00
60～64	-0.09	-0.10	0.01	-0.03	0.00	0.00
65～69	-0.13	-0.11	-0.02	-0.05	-0.04	-0.01
70～74	-0.14	-0.08	-0.06	-0.04	-0.03	-0.01
75～79	-0.11	-0.10	-0.01	-0.05	-0.06	0.01
80～84	-0.06	-0.07	0.01	-0.05	-0.06	0.01
85～89	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	0.01
90～94	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.02
95～99	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.01	0.02	-0.01	0.03	0.02	0.01
1～4	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10～14	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
15～19	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
20～24	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
25～29	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01
30～34	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
35～39	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
40～44	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00
45～49	0.00	0.03	-0.03	0.02	0.01	0.01
50～54	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.04	-0.02
55～59	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
60～64	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00
65～69	0.05	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01
70～74	0.03	0.02	0.01	0.04	0.01	0.03
75～79	0.03	0.02	0.01	0.04	-0.01	0.05
80～84	0.02	-0.01	0.03	0.03	-0.02	0.05
85～89	0.01	0.00	0.01	0.02	-0.01	0.03
90～94	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.02
95～99	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.02
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.24	-0.29	0.05	-0.09	-0.14	0.05
心疾患	-0.28	-0.17	-0.11	-0.16	-0.12	-0.04
脳血管疾患	0.08	0.10	-0.02	0.12	0.14	-0.02
肺炎	-0.13	-0.14	0.01	-0.11	-0.16	0.05
不慮の事故	0.01	0.04	-0.03	0.01	0.01	0.00
交通事故(再掲)	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.00
自殺	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.03	-0.01
肝疾患	-0.08	-0.08	0.00	-0.03	-0.04	0.01
腎不全	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	-0.03	0.00
糖尿病	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
高血圧性疾患	-0.05	-0.05	0.00	-0.02	-0.03	0.01
結核	-0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
老衰	0.06	0.06	0.00	0.12	0.12	0.00
新型コロナウイルス感染症	-0.07	...	...	-0.05	...	...
その他	0.05	0.03	0.02	0.07	0.01	0.06

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.04	-0.08	0.04	0.07	0.01	0.06
心疾患	0.04	0.09	-0.05	0.01	0.02	-0.01
脳血管疾患	0.05	0.04	0.01	0.06	0.07	-0.01
肺炎	0.05	0.04	0.01	0.04	0.02	0.02
不慮の事故	-0.01	-0.03	0.02	0.01	0.00	0.01
交通事故(再掲)	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.01	-0.01
自殺	-0.02	0.03	-0.05	0.00	-0.02	0.02
肝疾患	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
腎不全	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.02
糖尿病	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
高血圧性疾患	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.03
新型コロナウイルス感染症	-0.04	...	...	-0.03	...	...
その他	0.18	0.06	0.12	0.10	-0.03	0.13

奈良県

和歌山県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	奈良県	全国	地域差	奈良県	全国	地域差
令和2年	82.40	81.49	0.91	87.95	87.60	0.34
平成27年	81.36	80.77	0.58	87.25	87.01	0.24

	男			女		
	和歌山県	全国	地域差	和歌山県	全国	地域差
令和2年	81.03	81.49	-0.46	87.36	87.60	-0.25
平成27年	79.94	80.77	-0.83	86.47	87.01	-0.53

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.02	-0.03	0.05	-0.03	-0.05	0.02
1～4	-0.01	-0.01	0.00	-0.03	0.02	-0.05
5～9	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	-0.02
10～14	-0.01	0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.01
15～19	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
20～24	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
25～29	-0.02	-0.03	0.01	-0.01	-0.02	0.01
30～34	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.01	-0.02
35～39	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.02	-0.03
40～44	0.02	0.04	-0.02	0.01	-0.03	0.04
45～49	0.03	0.04	-0.01	0.02	0.01	0.01
50～54	0.06	0.02	0.04	0.01	0.01	0.00
55～59	0.09	0.04	0.05	0.02	0.05	-0.03
60～64	0.14	0.11	0.03	0.04	0.07	-0.03
65～69	0.15	0.10	0.05	0.05	0.04	0.01
70～74	0.17	0.16	0.01	0.09	0.07	0.02
75～79	0.13	0.09	0.04	0.06	0.04	0.02
80～84	0.11	0.04	0.07	0.09	-0.01	0.10
85～89	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02
90～94	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.01	-0.01
95～99	0.00	-0.01	0.01	0.02	0.00	0.02
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.04	-0.02	0.06	-0.04	0.00	-0.04
1～4	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01
5～9	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
10～14	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01
15～19	0.03	0.02	0.01	-0.01	-0.03	0.02
20～24	-0.01	-0.04	0.03	0.01	-0.04	0.05
25～29	-0.03	-0.07	0.04	0.02	-0.04	0.06
30～34	-0.03	-0.05	0.02	-0.03	0.00	-0.03
35～39	-0.01	-0.03	0.02	0.01	-0.02	0.03
40～44	-0.02	0.01	-0.03	-0.01	0.00	-0.01
45～49	-0.03	-0.04	0.01	-0.01	0.01	-0.02
50～54	-0.03	-0.04	0.01	0.00	-0.02	0.02
55～59	-0.04	-0.01	-0.03	0.03	0.04	-0.01
60～64	-0.04	-0.08	0.04	0.02	0.03	-0.01
65～69	-0.02	-0.05	0.03	-0.02	-0.03	0.01
70～74	-0.01	-0.08	0.07	0.00	-0.04	0.04
75～79	-0.03	-0.11	0.08	-0.04	-0.06	0.02
80～84	-0.09	-0.12	0.03	-0.05	-0.10	0.05
85～89	-0.07	-0.05	-0.02	-0.03	-0.14	0.11
90～94	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	-0.07	0.03
95～99	0.00	-0.01	0.01	-0.03	-0.03	0.00
100～	0.01	0.00	0.01	-0.02	0.00	-0.02

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.20	0.09	0.11	0.10	0.11	-0.01
心疾患	-0.01	-0.13	0.12	-0.07	-0.24	0.17
脳血管疾患	0.19	0.18	0.01	0.10	0.12	-0.02
肺炎	-0.02	0.00	-0.02	0.01	0.00	0.01
不慮の事故	0.05	0.05	0.00	0.05	0.04	0.01
交通事故(再掲)	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
自殺	-0.01	0.06	-0.07	-0.03	0.02	-0.05
肝疾患	0.04	0.01	0.03	0.02	0.00	0.02
腎不全	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01	-0.01
糖尿病	0.01	0.03	-0.02	0.00	0.01	-0.01
高血圧性疾患	-0.02	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.03	0.06	-0.03	0.05	0.06	-0.01
新型コロナウイルス感染症	0.02	...	...	0.01	...	...
その他	0.42	0.21	0.21	0.13	0.12	0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.22	-0.20	-0.02	0.06	0.04	0.02
心疾患	-0.27	-0.24	-0.03	-0.18	-0.27	0.09
脳血管疾患	0.10	0.07	0.03	0.12	0.04	0.08
肺炎	-0.05	-0.07	0.02	-0.05	-0.06	0.01
不慮の事故	-0.13	-0.07	-0.06	-0.09	0.00	-0.09
交通事故(再掲)	-0.02	-0.05	0.03	-0.03	-0.03	0.00
自殺	-0.06	-0.08	0.02	0.04	0.02	0.02
肝疾患	-0.01	-0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
腎不全	-0.01	-0.02	0.01	-0.03	-0.04	0.01
糖尿病	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
高血圧性疾患	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.04	-0.04	0.00	-0.14	-0.11	-0.03
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.02	...	...
その他	0.14	-0.19	0.33	-0.05	-0.18	0.13

鳥取県

島根県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	鳥取県	全国	地域差	鳥取県	全国	地域差
令和2年	81.34	81.49	-0.15	87.91	87.60	0.31
平成27年	80.17	80.77	-0.61	87.27	87.01	0.26

	男			女		
	島根県	全国	地域差	島根県	全国	地域差
令和2年	81.63	81.49	0.14	88.21	87.60	0.61
平成27年	80.79	80.77	0.01	87.64	87.01	0.64

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	-0.02	-0.05	0.03	-0.01	-0.16	0.15
1～4	-0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.02
5～9	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.02
10～14	0.01	-0.01	0.02	0.02	-0.01	0.03
15～19	0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.03	0.03
20～24	0.05	-0.01	0.06	-0.04	-0.02	-0.02
25～29	0.02	-0.04	0.06	0.02	-0.01	0.03
30～34	-0.09	0.03	-0.12	-0.02	0.01	-0.03
35～39	-0.01	-0.06	0.05	0.01	0.02	-0.01
40～44	0.00	-0.02	0.02	-0.01	0.03	-0.04
45～49	0.02	-0.04	0.06	0.02	0.01	0.01
50～54	0.02	-0.09	0.11	-0.03	0.03	-0.06
55～59	-0.03	-0.04	0.01	0.02	-0.01	0.03
60～64	-0.04	-0.03	-0.01	0.04	0.02	0.02
65～69	-0.07	-0.13	0.06	0.05	0.01	0.04
70～74	-0.07	-0.11	0.04	0.01	0.01	0.00
75～79	0.02	-0.02	0.04	0.04	0.07	-0.03
80～84	0.00	-0.04	0.04	0.09	0.08	0.01
85～89	0.01	0.00	0.01	0.08	0.09	-0.01
90～94	0.02	0.05	-0.03	0.02	0.06	-0.04
95～99	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.04	-0.02
100～	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.00	-0.05	0.05	-0.02	0.06	-0.08
1～4	0.02	0.02	0.00	0.03	0.01	0.02
5～9	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
10～14	-0.01	0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.01
15～19	0.03	-0.01	0.04	-0.01	0.00	-0.01
20～24	-0.05	-0.04	-0.01	0.02	0.00	0.02
25～29	0.01	-0.02	0.03	-0.01	-0.01	0.00
30～34	-0.02	-0.01	-0.01	0.02	-0.04	0.06
35～39	-0.01	0.02	-0.03	0.00	0.01	-0.01
40～44	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.02
45～49	-0.05	0.01	-0.06	-0.01	0.01	-0.02
50～54	0.02	0.00	0.02	0.01	0.05	-0.04
55～59	0.06	0.00	0.06	0.01	-0.01	0.02
60～64	0.00	0.01	-0.01	0.06	0.01	0.05
65～69	0.01	-0.04	0.05	0.08	0.02	0.06
70～74	0.02	0.06	-0.04	0.07	0.08	-0.01
75～79	0.04	0.02	0.02	0.06	0.12	-0.06
80～84	0.04	0.02	0.02	0.10	0.14	-0.04
85～89	0.00	0.01	-0.01	0.10	0.13	-0.03
90～94	0.01	0.01	0.00	0.04	0.05	-0.01
95～99	0.01	0.00	0.01	0.05	0.02	0.03
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.20	-0.45	0.25	0.05	0.00	0.05
心疾患	0.33	0.10	0.23	0.26	0.18	0.08
脳血管疾患	-0.01	-0.08	0.07	-0.06	-0.04	-0.02
肺炎	0.07	0.06	0.01	0.09	0.11	-0.02
不慮の事故	-0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	0.00
交通事故(再掲)	-0.01	-0.05	0.04	-0.01	-0.04	0.03
自殺	-0.04	-0.03	-0.01	0.09	0.03	0.06
肝疾患	0.03	-0.01	0.04	0.00	0.04	-0.04
腎不全	-0.01	-0.01	0.00	0.03	-0.03	0.06
糖尿病	0.00	-0.04	0.04	0.01	0.00	0.01
高血圧性疾患	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.06	-0.04	-0.02	-0.07	-0.07	0.00
新型コロナウイルス感染症	0.05	...	...	0.03	...	...
その他	-0.29	-0.09	-0.20	-0.12	0.05	-0.17

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.07	-0.12	0.05	0.12	0.12	0.00
心疾患	0.23	0.17	0.06	0.21	0.19	0.02
脳血管疾患	0.04	-0.02	0.06	0.01	0.00	0.01
肺炎	0.15	0.11	0.04	0.15	0.19	-0.04
不慮の事故	0.04	-0.04	0.08	0.04	0.01	0.03
交通事故(再掲)	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
自殺	-0.07	-0.09	0.02	0.02	0.00	0.02
肝疾患	0.02	0.02	0.00	0.04	0.01	0.03
腎不全	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.03	-0.02
糖尿病	0.01	0.03	-0.02	0.01	0.03	-0.02
高血圧性疾患	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.02	-0.04	0.06	0.06	-0.04	0.10
新型コロナウイルス感染症	0.05	...	...	0.03	...	...
その他	-0.32	-0.04	-0.28	-0.10	0.10	-0.20

岡山県

広島県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	岡山県	全国	地域差	岡山県	全国	地域差
令和2年	81.90	81.49	0.41	88.29	87.60	0.69
平成27年	81.03	80.77	0.26	87.673	87.01	0.66

	男			女		
	広島県	全国	地域差	広島県	全国	地域差
令和2年	81.95	81.49	0.45	88.16	87.60	0.56
平成27年	81.08	80.77	0.31	87.33	87.01	0.32

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.00	0.03	-0.03	0.02	0.02	0.00
1～4	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.02	-0.01
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
10～14	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01
15～19	-0.02	0.02	-0.04	0.00	0.02	-0.02
20～24	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
25～29	-0.02	-0.03	0.01	0.02	0.01	0.01
30～34	-0.02	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
35～39	-0.01	0.02	-0.03	0.00	0.03	-0.03
40～44	0.02	0.02	0.00	0.03	0.01	0.02
45～49	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	-0.02
50～54	0.04	0.01	0.03	0.02	0.03	-0.01
55～59	0.05	0.05	0.00	0.04	0.06	-0.02
60～64	0.08	0.03	0.05	0.05	0.07	-0.02
65～69	0.08	0.03	0.05	0.05	0.06	-0.01
70～74	0.07	0.05	0.02	0.07	0.06	0.01
75～79	0.08	0.04	0.04	0.12	0.08	0.04
80～84	0.05	0.01	0.04	0.09	0.08	0.01
85～89	0.01	-0.01	0.02	0.09	0.07	0.02
90～94	0.01	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01
95～99	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02
100～	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.03	-0.03	0.06	0.00	0.02	-0.02
1～4	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10～14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15～19	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
20～24	-0.01	0.00	-0.01	0.02	-0.02	0.04
25～29	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30～34	0.00	0.02	-0.02	0.02	0.00	0.02
35～39	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
40～44	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00
45～49	0.01	0.03	-0.02	0.03	0.00	0.03
50～54	0.04	0.00	0.04	0.03	0.00	0.03
55～59	-0.03	0.04	-0.07	0.04	0.05	-0.01
60～64	0.03	0.05	-0.02	0.02	0.03	-0.01
65～69	0.05	0.05	0.00	0.05	0.04	0.01
70～74	0.07	0.06	0.01	0.02	0.04	-0.02
75～79	0.09	0.03	0.06	0.07	-0.01	0.08
80～84	0.08	0.03	0.05	0.05	0.04	0.01
85～89	0.05	0.02	0.03	0.08	0.06	0.02
90～94	0.00	0.01	-0.01	0.04	0.06	-0.02
95～99	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.04
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.19	0.15	0.04	0.25	0.31	-0.06
心疾患	0.08	0.03	0.05	0.05	0.06	-0.01
脳血管疾患	0.06	0.03	0.03	0.09	0.05	0.04
肺炎	-0.03	-0.07	0.04	0.00	-0.05	0.05
不慮の事故	-0.04	-0.08	0.04	0.00	0.00	0.00
交通事故(再掲)	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.01
自殺	-0.03	0.01	-0.04	0.06	0.05	0.01
肝疾患	0.02	0.03	-0.01	0.00	0.00	0.00
腎不全	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02
糖尿病	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.01
高血圧性疾患	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.05	0.01	0.04	0.10	0.06	0.04
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	0.01	0.11	-0.10	0.06	0.15	-0.09

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.13	0.10	0.03	0.16	0.15	0.01
心疾患	-0.04	-0.01	-0.03	-0.08	-0.05	-0.03
脳血管疾患	0.08	0.11	-0.03	0.08	0.07	0.01
肺炎	0.04	0.02	0.02	0.04	0.03	0.01
不慮の事故	-0.03	-0.09	0.06	0.01	-0.04	0.05
交通事故(再掲)	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.01
自殺	0.02	0.03	-0.01	0.02	0.01	0.01
肝疾患	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
腎不全	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
糖尿病	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01
高血圧性疾患	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
結核	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
老衰	0.05	0.02	0.03	0.10	0.01	0.09
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	0.14	0.09	0.05	0.19	0.15	0.04

山口県

徳島県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	山口県	全国	地域差	山口県	全国	地域差
令和2年	81.12	81.49	-0.37	87.43	87.60	-0.17
平成27年	80.51	80.77	-0.27	86.88	87.01	-0.13

	男			女		
	徳島県	全国	地域差	徳島県	全国	地域差
令和2年	81.27	81.49	-0.22	87.42	87.60	-0.18
平成27年	80.32	80.77	-0.45	86.66	87.01	-0.35

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.07	0.07
1～4	-0.02	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01
5～9	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
10～14	0.00	0.01	-0.01	-0.03	0.00	-0.03
15～19	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	0.02
20～24	-0.01	0.03	-0.04	0.01	0.01	0.00
25～29	-0.01	-0.02	0.01	-0.02	-0.01	-0.01
30～34	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
35～39	-0.02	-0.03	0.01	0.01	-0.01	0.02
40～44	0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.02	0.01
45～49	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.04	0.02
50～54	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02	-0.03
55～59	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.04	-0.05
60～64	-0.06	-0.04	-0.02	0.01	-0.02	0.03
65～69	-0.05	-0.03	-0.02	0.00	-0.01	0.01
70～74	-0.03	-0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
75～79	-0.05	-0.05	0.00	-0.02	0.00	-0.02
80～84	-0.05	-0.07	0.02	-0.01	-0.01	0.00
85～89	-0.02	-0.04	0.02	0.00	0.01	-0.01
90～94	-0.03	-0.01	-0.02	-0.04	0.00	-0.04
95～99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.08	-0.08	0.00	-0.04	-0.09	0.05
1～4	0.04	-0.01	0.05	0.02	0.02	0.00
5～9	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00
10～14	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
15～19	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.01	0.01
20～24	-0.01	-0.04	0.03	0.01	-0.06	0.07
25～29	-0.05	0.00	-0.05	-0.02	-0.03	0.01
30～34	-0.02	0.03	-0.05	-0.02	-0.02	0.00
35～39	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
40～44	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
45～49	0.02	-0.02	0.04	0.00	-0.02	0.02
50～54	0.00	-0.06	0.06	0.02	0.00	0.02
55～59	-0.03	0.02	-0.05	-0.02	-0.02	0.00
60～64	-0.03	-0.03	0.00	0.03	0.01	0.02
65～69	-0.02	-0.02	0.00	0.01	-0.03	0.04
70～74	0.03	-0.02	0.05	-0.04	-0.04	0.00
75～79	0.03	-0.05	0.08	0.00	-0.03	0.03
80～84	-0.06	-0.07	0.01	-0.06	0.00	-0.06
85～89	-0.01	-0.07	0.06	-0.07	-0.04	-0.03
90～94	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	0.00
95～99	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.01
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.08	-0.04	-0.04	0.00	0.05	-0.05
心疾患	-0.16	-0.12	-0.04	-0.21	-0.11	-0.10
脳血管疾患	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
肺炎	-0.13	-0.14	0.01	-0.11	-0.15	0.04
不慮の事故	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
交通事故(再掲)	-0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.03	0.03
自殺	-0.07	0.00	-0.07	0.05	0.00	0.05
肝疾患	0.02	0.02	0.00	0.03	-0.01	0.04
腎不全	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.01
糖尿病	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01
高血圧性疾患	-0.02	0.01	-0.03	-0.01	0.01	-0.02
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.08	0.02	0.06	0.13	0.07	0.06
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.02	...	...
その他	-0.01	0.03	-0.04	-0.07	0.02	-0.09

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.10	0.15	-0.05	0.12	0.21	-0.09
心疾患	0.01	0.05	-0.04	0.03	-0.01	0.04
脳血管疾患	0.06	0.01	0.05	0.04	0.03	0.01
肺炎	-0.15	-0.15	0.00	-0.16	-0.13	-0.03
不慮の事故	-0.16	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	0.02
交通事故(再掲)	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
自殺	-0.02	0.01	-0.03	0.04	-0.07	0.11
肝疾患	-0.01	-0.02	0.01	-0.05	-0.03	-0.02
腎不全	-0.02	-0.03	0.01	-0.03	-0.05	0.02
糖尿病	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01
高血圧性疾患	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01
結核	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
老衰	0.04	-0.02	0.06	0.01	0.00	0.01
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	-0.09	-0.35	0.26	-0.10	-0.21	0.11

香川県

愛媛県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	香川県	全国	地域差	香川県	全国	地域差
令和2年	81.56	81.49	0.07	87.64	87.60	0.04
平成27年	80.85	80.77	0.08	87.21	87.01	0.20

	男			女		
	愛媛県	全国	地域差	愛媛県	全国	地域差
令和2年	81.13	81.49	-0.36	87.34	87.60	-0.27
平成27年	80.16	80.77	-0.61	86.82	87.01	-0.19

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.01	0.01	0.00	0.05	0.10	-0.05
1～4	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.02	-0.02
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
10～14	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.00	0.01
15～19	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00
20～24	-0.06	-0.05	-0.01	-0.01	-0.05	0.04
25～29	-0.02	-0.08	0.06	0.00	0.01	-0.01
30～34	-0.05	-0.05	0.00	-0.01	-0.03	0.02
35～39	0.02	-0.01	0.03	-0.03	0.00	-0.03
40～44	-0.01	-0.02	0.01	0.00	0.01	-0.01
45～49	-0.04	0.02	-0.06	-0.04	0.00	-0.04
50～54	0.04	-0.01	0.05	-0.02	0.08	-0.10
55～59	0.03	0.00	0.03	0.05	0.02	0.03
60～64	0.01	0.05	-0.04	0.00	0.02	-0.02
65～69	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	-0.01
70～74	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
75～79	0.03	0.10	-0.07	0.05	0.00	0.05
80～84	0.03	0.05	-0.02	0.04	-0.02	0.06
85～89	0.01	0.04	-0.03	0.01	0.00	0.01
90～94	0.02	0.02	0.00	-0.02	-0.03	0.01
95～99	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.03	-0.06
100～	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.08	0.05	0.03	0.03	0.03	0.00
1～4	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	-0.02
5～9	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
10～14	0.00	-0.02	0.02	0.00	-0.01	0.01
15～19	0.03	-0.04	0.07	-0.01	-0.03	0.02
20～24	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.01
25～29	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.00
30～34	-0.02	-0.04	0.02	0.01	0.01	0.00
35～39	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01
40～44	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.05	0.03
45～49	-0.04	-0.06	0.02	-0.02	-0.01	-0.01
50～54	-0.02	-0.05	0.03	-0.03	0.01	-0.04
55～59	-0.05	-0.08	0.03	-0.03	-0.01	-0.02
60～64	-0.08	-0.11	0.03	0.00	-0.04	0.04
65～69	-0.06	-0.04	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02
70～74	-0.03	-0.04	0.01	-0.02	0.00	-0.02
75～79	-0.02	-0.04	0.02	-0.05	-0.07	0.02
80～84	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.02	-0.03
85～89	0.00	0.01	-0.01	-0.03	0.02	-0.05
90～94	-0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.03	0.03
95～99	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.02
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.15	0.10	0.05	0.09	0.31	-0.22
心疾患	-0.12	-0.17	0.05	-0.15	-0.15	0.00
脳血管疾患	0.04	0.07	-0.03	0.06	0.07	-0.01
肺炎	0.15	0.21	-0.06	0.10	0.11	-0.01
不慮の事故	-0.08	-0.13	0.05	-0.02	-0.05	0.03
交通事故(再掲)	-0.07	-0.10	0.03	-0.02	-0.05	0.03
自殺	-0.02	-0.01	-0.01	0.03	-0.01	0.04
肝疾患	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.01
腎不全	0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.03	0.01
糖尿病	-0.05	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01
高血圧性疾患	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.02
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	-0.05	0.00	-0.05	-0.07	-0.01	-0.06
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.03	...	...
その他	-0.01	-0.01	0.00	0.04	-0.04	0.08

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.04	-0.05	0.09	0.06	0.15	-0.09
心疾患	-0.33	-0.34	0.01	-0.30	-0.32	0.02
脳血管疾患	-0.02	0.01	-0.03	-0.02	0.01	-0.03
肺炎	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	0.02	-0.05
不慮の事故	-0.10	-0.18	0.08	-0.06	-0.06	0.00
交通事故(再掲)	-0.04	-0.05	0.01	-0.03	-0.02	-0.01
自殺	-0.07	-0.05	-0.02	0.05	-0.02	0.07
肝疾患	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01
腎不全	-0.01	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
糖尿病	-0.02	0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.00
高血圧性疾患	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.02
結核	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.00	-0.02	0.02	-0.04	-0.05	0.01
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	0.13	0.06	0.07	0.07	0.08	-0.01

高知県

福岡県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	高知県	全国	地域差	高知県	全国	地域差
令和2年	80.79	81.49	-0.71	87.84	87.60	0.24
平成27年	80.26	80.77	-0.51	87.01	87.01	0.00

	男			女		
	福岡県	全国	地域差	福岡県	全国	地域差
令和2年	81.38	81.49	-0.11	87.70	87.60	0.10
平成27年	80.66	80.77	-0.11	87.14	87.01	0.13

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.09	-0.06	-0.03	-0.01	0.07	-0.08
1～4	-0.05	-0.04	-0.01	-0.01	-0.03	0.02
5～9	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	0.01
10～14	-0.03	0.02	-0.05	-0.01	-0.01	0.00
15～19	-0.01	-0.01	0.00	0.03	0.01	0.02
20～24	-0.03	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	0.00
25～29	-0.05	0.02	-0.07	-0.01	-0.02	0.01
30～34	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.02
35～39	-0.03	0.01	-0.04	-0.03	-0.04	0.01
40～44	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
45～49	-0.03	0.00	-0.03	-0.05	0.01	-0.06
50～54	-0.02	-0.02	0.00	-0.06	0.02	-0.08
55～59	-0.04	-0.13	0.09	0.02	-0.02	0.04
60～64	-0.09	-0.08	-0.01	0.06	-0.03	0.09
65～69	-0.09	-0.09	0.00	0.02	0.03	-0.01
70～74	-0.03	-0.08	0.05	-0.02	-0.02	0.00
75～79	-0.03	-0.03	0.00	0.04	-0.03	0.07
80～84	0.01	0.04	-0.03	0.10	0.08	0.02
85～89	0.00	0.02	-0.02	0.07	0.06	0.01
90～94	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.07
95～99	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
100～	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.02

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0歳	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	0.00
1～4	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10～14	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
15～19	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
20～24	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01
25～29	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.02	-0.02
30～34	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
35～39	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
40～44	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.01	-0.01
45～49	0.01	-0.02	0.03	0.00	0.00	0.00
50～54	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.01	-0.01
55～59	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	0.00
60～64	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.01
65～69	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.02
70～74	-0.04	0.00	-0.04	-0.01	-0.01	0.00
75～79	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
80～84	-0.01	0.00	-0.01	0.03	0.04	-0.01
85～89	0.00	-0.01	0.01	0.05	0.05	0.00
90～94	-0.01	0.00	-0.01	0.04	0.04	0.00
95～99	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.02	-0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.20	-0.02	-0.18	0.11	0.04	0.07
心疾患	0.03	-0.08	0.11	-0.03	-0.14	0.11
脳血管疾患	-0.02	-0.04	0.02	-0.02	0.00	-0.02
肺炎	-0.04	-0.08	0.04	-0.09	-0.13	0.04
不慮の事故	-0.22	-0.27	0.05	-0.04	-0.10	0.06
交通事故(再掲)	-0.06	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01
自殺	-0.12	0.02	-0.14	0.06	0.00	0.06
肝疾患	-0.03	-0.04	0.01	0.01	0.01	0.00
腎不全	-0.03	-0.04	0.01	-0.04	-0.03	-0.01
糖尿病	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
高血圧性疾患	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.09	0.08	0.01	0.25	0.18	0.07
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.03	...	...
その他	-0.22	-0.06	-0.16	-0.04	0.15	-0.19

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.20	-0.21	0.01	-0.16	-0.19	0.03
心疾患	0.39	0.48	-0.09	0.26	0.35	-0.09
脳血管疾患	0.08	0.05	0.03	0.09	0.12	-0.03
肺炎	-0.03	-0.05	0.02	-0.02	-0.06	0.04
不慮の事故	-0.03	-0.03	0.00	-0.01	-0.03	0.02
交通事故(再掲)	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01
自殺	-0.01	-0.03	0.02	0.00	0.03	-0.03
肝疾患	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.02
腎不全	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
糖尿病	-0.02	-0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
高血圧性疾患	-0.03	-0.03	0.00	-0.02	-0.02	0.00
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.12	0.09	0.03	0.27	0.22	0.05
新型コロナウイルス感染症	0.00	...	...	0.01	...	...
その他	-0.38	-0.36	-0.02	-0.31	-0.28	-0.03

佐賀県

長崎県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	佐賀県	全国	地域差	佐賀県	全国	地域差
令和2年	81.41	81.49	-0.08	87.78	87.60	0.17
平成27年	80.65	80.77	-0.12	87.12	87.01	0.11

	男			女		
	長崎県	全国	地域差	長崎県	全国	地域差
令和2年	81.01	81.49	-0.48	87.41	87.60	-0.20
平成27年	80.38	80.77	-0.40	86.97	87.01	-0.04

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.00	0.02	-0.02	-0.04	0.08	-0.12
1～4	0.00	0.02	-0.02	0.02	-0.01	0.03
5～9	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.02
10～14	0.01	0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.02
15～19	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02	-0.03
20～24	-0.03	0.00	-0.03	-0.02	0.03	-0.05
25～29	-0.05	-0.01	-0.04	0.00	0.02	-0.02
30～34	-0.04	0.00	-0.04	0.02	0.01	0.01
35～39	0.04	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.03
40～44	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01
45～49	-0.01	-0.06	0.05	0.01	-0.08	0.09
50～54	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.02	0.03
55～59	-0.03	-0.01	-0.02	0.01	0.04	-0.03
60～64	0.00	0.02	-0.02	0.05	-0.02	0.07
65～69	0.01	-0.01	0.02	0.05	-0.01	0.06
70～74	0.03	-0.01	0.04	0.01	-0.01	0.02
75～79	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.00	0.01
80～84	0.00	-0.04	0.04	0.04	0.03	0.01
85～89	0.02	-0.01	0.03	-0.01	0.06	-0.07
90～94	-0.01	-0.03	0.02	0.02	-0.02	0.04
95～99	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.02
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	-0.03	0.03	-0.06	-0.09	-0.01	-0.08
1～4	0.00	-0.01	0.01	-0.03	0.00	-0.03
5～9	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01
10～14	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01
15～19	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.05	0.07
20～24	-0.04	0.01	-0.05	0.02	0.00	0.02
25～29	-0.06	-0.02	-0.04	0.00	-0.01	0.01
30～34	-0.01	-0.06	0.05	0.00	0.02	-0.02
35～39	0.00	-0.04	0.04	-0.02	0.00	-0.02
40～44	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	-0.01
45～49	0.00	-0.04	0.04	0.01	-0.01	0.02
50～54	-0.07	-0.02	-0.05	-0.01	-0.01	0.00
55～59	-0.08	-0.04	-0.04	-0.01	-0.05	0.04
60～64	-0.06	-0.06	0.00	-0.01	-0.01	0.00
65～69	-0.06	-0.01	-0.05	0.01	0.01	0.00
70～74	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	0.02	-0.03
75～79	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	0.04	-0.06
80～84	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.02	-0.01
85～89	0.00	-0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
90～94	-0.03	-0.01	-0.02	-0.04	0.01	-0.05
95～99	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.17	-0.19	0.02	0.00	-0.15	0.15
心疾患	0.22	0.28	-0.06	0.09	0.18	-0.09
脳血管疾患	0.04	-0.01	0.05	0.04	0.02	0.02
肺炎	-0.03	-0.08	0.05	-0.09	-0.10	0.01
不慮の事故	-0.03	-0.09	0.06	-0.02	-0.01	-0.01
交通事故(再掲)	-0.01	-0.05	0.04	-0.02	-0.01	-0.01
自殺	-0.07	0.00	-0.07	0.05	0.11	-0.06
肝疾患	0.02	0.02	0.00	0.03	0.00	0.03
腎不全	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.02
糖尿病	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
高血圧性疾患	0.00	-0.02	0.02	0.00	-0.02	0.02
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.08	0.07	0.01	0.17	0.18	-0.01
新型コロナウイルス感染症	0.05	...	...	0.02	...	...
その他	-0.18	-0.09	-0.09	-0.12	-0.10	-0.02

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.22	-0.22	0.00	-0.14	-0.12	-0.02
心疾患	0.08	0.07	0.01	-0.02	0.02	-0.04
脳血管疾患	0.02	0.07	-0.05	0.07	0.07	0.00
肺炎	-0.06	-0.05	-0.01	-0.06	-0.03	-0.03
不慮の事故	-0.04	-0.09	0.05	-0.01	-0.05	0.04
交通事故(再掲)	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
自殺	0.05	-0.03	0.08	0.12	0.07	0.05
肝疾患	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
腎不全	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01
糖尿病	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.02	-0.01
高血圧性疾患	0.03	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.10	0.06	0.04	0.22	0.14	0.08
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.02	...	...
その他	-0.49	-0.22	-0.27	-0.42	-0.17	-0.25

熊本県

大分県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	熊本県	全国	地域差	熊本県	全国	地域差
令和2年	81.91	81.49	0.41	88.22	87.60	0.62
平成27年	81.22	80.77	0.44	87.49	87.01	0.48

	男			女		
	大分県	全国	地域差	大分県	全国	地域差
令和2年	81.88	81.49	0.39	87.99	87.60	0.39
平成27年	81.08	80.77	0.30	87.31	87.01	0.30

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	-0.03	0.02	-0.05	0.01	0.05	-0.04
1～4	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.03
5～9	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.02
10～14	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
15～19	0.00	0.02	-0.02	0.02	-0.02	0.04
20～24	-0.03	0.01	-0.04	0.01	0.00	0.01
25～29	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.02	0.00
30～34	0.02	-0.02	0.04	0.01	0.00	0.01
35～39	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.02	0.03
40～44	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.01	-0.01
45～49	-0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.02	0.02
50～54	-0.03	-0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
55～59	0.00	0.04	-0.04	0.03	0.03	0.00
60～64	0.04	0.03	0.01	0.03	0.04	-0.01
65～69	0.10	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02
70～74	0.09	0.10	-0.01	0.05	0.05	0.00
75～79	0.14	0.10	0.04	0.10	0.08	0.02
80～84	0.13	0.08	0.05	0.11	0.11	0.00
85～89	0.04	0.05	-0.01	0.11	0.07	0.04
90～94	0.01	0.01	0.00	0.04	0.06	-0.02
95～99	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.03	-0.03	0.06	0.01	0.00	0.01
1～4	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.02	0.02
5～9	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
10～14	0.01	-0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.00
15～19	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.03	0.03
20～24	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	-0.02
25～29	-0.05	0.01	-0.06	0.01	0.00	0.01
30～34	-0.03	0.00	-0.03	-0.02	0.01	-0.03
35～39	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
40～44	-0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.02	-0.03
45～49	0.00	0.02	-0.02	0.02	0.02	0.00
50～54	0.01	-0.01	0.02	0.03	0.03	0.00
55～59	0.07	0.06	0.01	0.03	0.02	0.01
60～64	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00
65～69	0.04	0.07	-0.03	0.07	0.02	0.05
70～74	0.10	0.06	0.04	0.04	0.04	0.00
75～79	0.10	0.09	0.01	0.06	0.06	0.00
80～84	0.04	0.01	0.03	0.07	0.03	0.04
85～89	0.01	0.01	0.00	0.06	0.05	0.01
90～94	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	-0.02
95～99	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01
100～	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.19	0.22	-0.03	0.12	0.18	-0.06
心疾患	0.12	0.13	-0.01	0.07	0.10	-0.03
脳血管疾患	0.07	0.06	0.01	0.06	0.06	0.00
肺炎	0.06	0.07	-0.01	0.04	0.07	-0.03
不慮の事故	-0.07	-0.02	-0.05	0.01	0.01	0.00
交通事故(再掲)	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.01
自殺	-0.03	-0.03	0.00	0.06	0.02	0.04
肝疾患	-0.01	0.03	-0.04	0.01	0.01	0.00
腎不全	0.00	0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.01
糖尿病	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	-0.01
高血圧性疾患	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.07	0.04	0.03	0.16	0.08	0.08
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.02	...	...
その他	-0.06	-0.09	0.03	0.06	-0.06	0.12

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.21	0.24	-0.03	0.19	0.17	0.02
心疾患	0.11	0.10	0.01	0.08	0.13	-0.05
脳血管疾患	-0.01	0.04	-0.05	-0.02	0.04	-0.06
肺炎	0.05	-0.02	0.07	0.00	-0.05	0.05
不慮の事故	-0.09	-0.07	-0.02	-0.07	-0.07	0.00
交通事故(再掲)	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02
自殺	-0.09	0.03	-0.12	0.04	0.01	0.03
肝疾患	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	-0.02
腎不全	-0.01	0.00	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01
糖尿病	0.02	-0.01	0.03	-0.01	0.01	-0.02
高血圧性疾患	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.07	0.05	0.02	0.15	0.13	0.02
新型コロナウイルス感染症	0.03	...	...	0.02	...	...
その他	0.05	-0.08	0.13	-0.01	-0.06	0.05

宮崎県

鹿児島県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	宮崎県	全国	地域差	宮崎県	全国	地域差
令和2年	81.15	81.49	-0.34	87.60	87.60	-0.01
平成27年	80.34	80.77	-0.43	87.12	87.01	0.11

	男			女		
	鹿児島県	全国	地域差	鹿児島県	全国	地域差
令和2年	80.95	81.49	-0.55	87.53	87.60	-0.07
平成27年	80.02	80.77	-0.75	86.78	87.01	-0.23

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	0.01
1～4	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01
5～9	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
10～14	0.00	-0.03	0.03	0.01	-0.01	0.02
15～19	0.00	-0.01	0.01	-0.02	0.01	-0.03
20～24	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
25～29	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	0.02	-0.05
30～34	-0.05	-0.01	-0.04	-0.01	0.01	-0.02
35～39	-0.02	-0.06	0.04	0.00	0.01	-0.01
40～44	-0.05	-0.08	0.03	-0.01	-0.01	0.00
45～49	-0.04	-0.07	0.03	-0.01	0.01	-0.02
50～54	-0.07	-0.07	0.00	-0.04	-0.02	-0.02
55～59	-0.04	-0.06	0.02	-0.03	-0.01	-0.02
60～64	-0.05	-0.06	0.01	0.02	-0.03	0.05
65～69	-0.04	-0.07	0.03	0.00	0.02	-0.02
70～74	-0.01	0.02	-0.03	0.00	0.03	-0.03
75～79	0.06	0.06	0.00	-0.03	0.02	-0.05
80～84	0.04	0.05	-0.01	0.03	0.02	0.01
85～89	0.01	0.02	-0.01	0.04	0.05	-0.01
90～94	0.01	-0.02	0.03	0.04	-0.01	0.05
95～99	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
100～	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.01	-0.04	0.05	-0.03	-0.05	0.02
1～4	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
5～9	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
10～14	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
15～19	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.01	0.01
20～24	-0.05	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01
25～29	-0.09	-0.07	-0.02	0.00	0.00	0.00
30～34	-0.04	-0.01	-0.03	0.00	-0.02	0.02
35～39	-0.01	-0.01	0.00	-0.06	-0.01	-0.05
40～44	-0.06	-0.05	-0.01	0.00	0.00	0.00
45～49	-0.06	-0.09	0.03	-0.01	0.01	-0.02
50～54	-0.07	-0.08	0.01	0.01	-0.06	0.07
55～59	-0.07	-0.13	0.06	-0.04	-0.05	0.01
60～64	-0.08	-0.07	-0.01	0.01	-0.01	0.02
65～69	-0.07	-0.06	-0.01	0.02	-0.02	0.04
70～74	0.00	-0.03	0.03	0.02	-0.08	0.10
75～79	0.02	0.03	-0.01	0.01	-0.01	0.02
80～84	0.04	-0.03	0.07	0.02	0.03	-0.01
85～89	0.03	-0.01	0.04	0.01	0.02	-0.01
90～94	0.02	-0.01	0.03	0.01	0.02	-0.01
95～99	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
100～	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.04	-0.02	-0.02	0.01	0.16	-0.15
心疾患	-0.04	-0.08	0.04	-0.10	-0.14	0.04
脳血管疾患	-0.06	-0.08	0.02	-0.08	-0.09	0.01
肺炎	-0.04	-0.06	0.02	-0.07	-0.07	0.00
不慮の事故	-0.07	-0.13	0.06	-0.02	-0.01	-0.01
交通事故(再掲)	-0.01	-0.04	0.03	-0.02	0.01	-0.03
自殺	-0.10	-0.12	0.02	0.02	0.01	0.01
肝疾患	-0.02	-0.03	0.01	-0.01	0.01	-0.02
腎不全	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.01
糖尿病	-0.05	0.00	-0.05	-0.01	0.00	-0.01
高血圧性疾患	-0.03	0.01	-0.04	-0.01	0.00	-0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.08	0.06	0.02	0.20	0.13	0.07
新型コロナウイルス感染症	0.04	...	...	0.03	...	...
その他	-0.02	0.04	-0.06	0.07	0.11	-0.04

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	-0.01	0.03	-0.04	0.12	0.06	0.06
心疾患	0.03	0.05	-0.02	-0.03	0.06	-0.09
脳血管疾患	-0.02	-0.13	0.11	-0.07	-0.17	0.10
肺炎	-0.08	-0.15	0.07	-0.10	-0.15	0.05
不慮の事故	-0.14	-0.19	0.05	-0.04	-0.06	0.02
交通事故(再掲)	-0.02	-0.05	0.03	0.00	-0.01	0.01
自殺	-0.11	-0.02	-0.09	0.03	0.03	0.00
肝疾患	-0.01	-0.04	0.03	0.00	0.02	-0.02
腎不全	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	-0.04	0.01
糖尿病	-0.03	-0.03	0.00	-0.01	-0.02	0.01
高血圧性疾患	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.07	0.04	0.03	0.14	0.14	0.00
新型コロナウイルス感染症	0.05	...	...	0.03	...	...
その他	-0.27	-0.30	0.03	-0.12	-0.10	-0.02

沖縄県

平均寿命と地域差（全国値との差）

（単位 年）

	男			女		
	沖縄県	全国	地域差	沖縄県	全国	地域差
令和2年	80.73	81.49	-0.76	87.88	87.60	0.28
平成27年	80.27	80.77	-0.50	87.44	87.01	0.44

地域差 年齢別 寄与（0歳および年齢5歳階級）

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
0 歳	0.00	-0.02	0.02	0.00	-0.02	0.02
1～4	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
5～9	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
10～14	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01
15～19	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02
20～24	0.00	-0.02	0.02	-0.01	0.00	-0.01
25～29	0.02	0.02	0.00	0.01	-0.01	0.02
30～34	-0.02	0.00	-0.02	0.01	-0.03	0.04
35～39	-0.04	-0.05	0.01	-0.02	-0.03	0.01
40～44	-0.13	-0.09	-0.04	-0.06	-0.07	0.01
45～49	-0.16	-0.12	-0.04	-0.07	-0.04	-0.03
50～54	-0.17	-0.17	0.00	-0.07	-0.04	-0.03
55～59	-0.22	-0.15	-0.07	-0.06	-0.08	0.02
60～64	-0.19	-0.20	0.01	-0.07	-0.06	-0.01
65～69	-0.14	-0.10	-0.04	-0.03	0.04	-0.07
70～74	-0.05	-0.01	-0.04	0.01	0.06	-0.05
75～79	0.04	0.10	-0.06	0.02	0.06	-0.04
80～84	0.11	0.11	0.00	0.12	0.11	0.01
85～89	0.10	0.11	-0.01	0.18	0.25	-0.07
90～94	0.08	0.05	0.03	0.22	0.20	0.02
95～99	0.01	0.03	-0.02	0.08	0.10	-0.02
100～	-0.01	0.01	-0.02	0.03	0.01	0.02

地域差 死因別 寄与

（単位 年）

	男			女		
	令和2年	平成27年	差	令和2年	平成27年	差
悪性新生物	0.02	0.25	-0.23	0.08	0.15	-0.07
心疾患	-0.04	0.00	-0.04	0.17	0.17	0.00
脳血管疾患	-0.11	-0.02	-0.09	0.01	0.12	-0.11
肺炎	0.11	0.11	0.00	0.13	0.15	-0.02
不慮の事故	0.00	-0.04	0.04	0.08	0.08	0.00
交通事故(再掲)	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.01	-0.01
自殺	0.04	-0.08	0.12	0.05	0.01	0.04
肝疾患	-0.33	-0.19	-0.14	-0.13	-0.10	-0.03
腎不全	-0.01	0.01	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
糖尿病	-0.04	-0.04	0.00	-0.03	-0.03	0.00
高血圧性疾患	-0.04	-0.02	-0.02	-0.04	0.00	-0.04
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老衰	0.04	0.05	-0.01	0.21	0.20	0.01
新型コロナウイルス感染症	-0.06	...	...	-0.06	...	...
その他	-0.35	-0.52	0.17	-0.16	-0.30	0.14